Prólogo a la vigésimonona edición alemana

Por ser muchas las modificaciones y ampliaciones que me han sido propuestas por los numerosos adeptos de este libro, no pudieron ser tenidas en cuenta todas en esta nueva edición. La razón principal de esto fué el coste elevado de los trabajos tipográficos, circunstancia que nos obligó a ser parcos en la reforma de la actual edición.

La tabla de «antilogaritmos» de cuatro cifras ha vuelto a ser adoptada, a petición de muchos de nuestros lectores. Como tablas nuevas figuran dos auxiliares correspondientes a las principales VII y XII.

La tabla auxiliar de la VII está destinada para calcular los análisis elementales de compuestos orgánicos ricos en nitrógeno. En estos casos supone un error el tomar la temperatura en números redondeados — según es lo corriente —, sin tener en cuenta las correspondientes correcciones de presión. Dichos errores resultan eliminados tomando en consideración la mencionada tabla auxiliar. Para más detalles sobre este particular, véase el estudio de E. Mohr que se cita en la página 44.

La tabla auxiliar de la XII presta buenos servicios al aforar vasijas volumétricas, como matraces, pipetas, etc., indicadoras de volúmenes redondeados (son las vasijas corrientes del comercio). Dicha tabla permite calcular de manera fácil la diferencia entre el volumen de la vasija y el que debe tener a la temperatura normal; basta para ello pesar la vasija llena de agua a cualquier temperatura.

Dicha tabla auxiliar da inmediatamente el peso del agua contenida en una vasija exacta a la temperatura normal, cuando la pesada se hace a temperatura distinta. Teniendo este dato

real de la pesada se llega fácilmente a determinar el error de una vasija a la temperatura normal. En esta tabla se han omitido los logaritmos de los pesos del litro, porque se trata esencialmente de números redondeados que se pueden multiplicar sin necesidad de logaritmos por los pesos del litro.

En esta edición de las tablas logaritmicas se han tomado en cuenta correcciones y mejoras enviadas por los señores siguientes: cand. ing. M. Apfelbaum, Viena; Dr. G. Bruhns, Charlottenburgo; químico en jefe L. Chaveau, Casablanca (Marruecos); laboratorios Fresenius, Wiesbaden; estudiante Otto Hecht, Charlottenburgo; Dr. W. Herrmann, Jeverkusen; Dr. W. von Heygendorf, Leipzig; Dr. H. Kreusler, Charlottenburg; prof. Dr. E. Mohr, Heidelberg; Dr. M. C. Neuburger, Viena; prof. Dr. W. A. Roth, Brunsviga; químico en jefe Dr. R. Saar, Halle a. d. Saale. A todos los autedichos señores doy mis más sinceras gracias y solicito de ellos su colaboración futura en análoga forma.

Agradecería que todas las observaciones fueran dirigidas a mi domicilio, Weissenburg Strasse, 36, Marburg (Lahn).

A. THIEL