platten die so lange offene Frage nach mehreren Mesonenmassen in dem Sinne sicher zu beantworten, daß es wenigstens zwei Mesonensorten der Masse um 260 und 200 gibt, die durch Zerfall ineinander übergehen. Damit hat die Photoplatte erneut ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt.

Die Entwicklung der heutigen Meßtechnik geht offenbar zwei Wege, von denen der eine über immer umfangreicher werdende Apparaturen zu immer größerer Meßgenauigkeit bei der Beobachtung einzelner Prozesse führt, während der andere mit möglichst einfachen Mitteln eine Unmenge von Beobachtungsmaterial liefern kann. Die Schwierigkeit hierbei liegt in der sehr zeitraubenden Auswertung der Einzel-

beobachtungen. Andererseits ermöglicht der Einsatz photographischer Emulsionen einem großen Kreis interessierter Personen, sich an der Höhenstrahlenforschung zu beteiligen. In Zusammenarbeit mit den bereits bestehenden Forschungsstellen für Kernphysik und Höhenstrahlung würde sich hierdurch unser Bild von dem Verhalten der Elementarteilchen in vielen Punkten verbessern oder festigen lassen.

Zum Schluß möchte ich nicht versäumen, Hrn. Dr. K. H. Höcker auch an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank für verschiedene wertvolle Hinweise bei der Abfassung dieser Arbeit auszusprechen.

Fritz-Inger Callisen,
Physikal. Staatsinstitut Hamburg.

Zur Isotopenforschung

Einem kürzlich gehaltenen Vortrag von Prof. Harold C. Urey, Chicago, entnehmen wir folgendes:

Bei der Isotopentrennung durch chemischen Austausch lassen sich die Gleichgewichtskonstanten in vielen Fällen exakt berechnen, bei komplizierteren Molekülen, wie z. B. dem Carbonation, näherungsweise unter Benützung vereinfachter Modelle. Für den Austausch Chlorid—Perchlorat wird ein Unterschied von 9% in der Reaktionskonstante der beiden Chlorisotope vorhergesagt; die Reaktion ließ sich aber bisher nicht verwirklichen.

Urey will sich in Zukunft auch erdgeschichtlichen Problemen zuwenden. Durch Messung des Sauerstoffisotopen-Verhältnisses in den Carbonaten verschieden alter Gesteinsschichten können Rückschlüsse auf den vergangenen und zukünftigen Temperaturverlauf der

Erde gezogen werden. Dieses Verhältnis sollte nämlich bei Gesteinen, die seit ihrem Kohlensäure—Wasser-Austausch ruhig gelagert haben, hauptsächlich bestimmt sein durch die bei ihrer Entstehung herrschende Temperatur. Dergleichen Verschiebungen sind z. B. in voneinander verschiedenen Meteoriten aufgefunden worden. Die Temperaturabhängigkeit jenes Gleichgewichts ist experimentell bestimmt. Bei Gesteinen verschiedenen Alters und so verschiedener Entstehungstemperatur wird mit Unterschieden von 0,1% im Mischungsverhältnis O^{16}/O^{18} gerechnet. Ein neuer, in Chicago gebauter Massenspektrograph, der es gestattet, die beiden Vergleichsproben ohne Unterbrechung der Analyse wechselseitig in den Emissionsraum zu bringen, soll nach Schätzung von Nier noch Verschiebungen von 0,02% fassen. Roland Lindner.

IN MEMORIAM

Friedrich Nölke †

Am 16. Juni 1947 ist Professor Dr. Friedrich Nölke in Bremen kurz vor Vollendung seines 70. Lebensjahres einem Verkehrsunfall zum Opfer gefallen. Mit ihm ist eine Persönlichkeit dahingegangen, die auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Kosmogonie und Geotektonik einen angesehenen Namen besaß, so daß sein Hinscheiden besonders in dem Augenblick, wo sich in der Kosmogonie völlig neuartige Gesichtspunkte abzuzeichnen beginnen, einen schmerzlichen Verlust bedeutet.

Friedrich Nölke wurde am 17. Juli 1877 zu Bremen geboren. Er studierte von 1899 bis 1902 in Marburg und Berlin Mathematik, Physik und Geographie, promovierte 1903 bei F. Schottky zum Dr. phil., wurde 1905 Studienrat und 1919 Professor in Bremen, wo er bis zu seiner Emeritierung im Herbst 1945 als Oberstudiendirektor wirkte.

Schon frühzeitig, als die Beschäftigung mit kosmogonischen Fragen auf mathematisch-physikalischen

Grundlagen noch ein besonderes Wagnis darstellte, wandte er dem Entwicklungsproblem des Planetensystems sein Interesse zu, indem er die zahlreichen zu seiner Erklärung ersonnenen Hypothesen einer strengen Kritik unterwarf und dabei rückhaltlos jene Schwächen aufzeigte, die ihm mit den Grundlagen der Mechanik und empirischen Astrophysik unvereinbar erschienen. Jahrzehnte hindurch war er auf diesem Gebiet der vorsichtige Warner und Rufer im Streite, so daß seinem wohlabgewogenen Urteil vieles anheimfiel, was äußerlich als gesicherter Bestand des Wissens gelten mochte. Indessen blieb ihm dabei aber doch die Möglichkeit, den Weg zu eigenen Anschauungen über den Gang des kosmischen Werdens zu finden. Und insofern glaubte er in der Nebularhypothese die einzige Grundlage zur Diskussion der Entwicklung des Planetensystems erkennen zu sollen, wenn auch in dem Sinne, daß eine Verfolgung des Entwicklungsganges erst von dem Moment an denk-