dauer betrug dann nur 30–60 Min. Die Banden wurden, wie oben beschrieben, photographisch sichtbar gemacht, die Papierstreifen auseinander geschnitten und, wie bei der Papierchromatographie beschrieben, weiter behandelt. Für die Versuche im Tiselius-Apparat wurde eine normale Zelle von 11 ccm Fassungsvermögen verwendet. Die Beobachtung erfolgte nach dem System von Philipot-Svensson. Die Feldstärke betrug 6 Volt/cm.

Chemische Fraktionierung: Die Fraktionierung erfolgte durch Zugabe von *m*/10-Ammoniumformiat von p_H 3,5. Der Niederschlag wurde abzentrifugiert und in *m*/10-NaHCO₃ gelöst. Die weitere Fällung erfolgte dann durch Zugabe von HCl, wobei die p_H -Verschiebung mit der Glaselektrode kontrolliert wurde. Ein Teil des Niederschlags wurde unmittelbar zur Hydrolyse mit HClO₄ verwendet. Ein anderer Teil wurde in NaHCO₃ wieder gelöst, dialysiert und auf seine Spaltbarkeit mit Ribonuclease untersucht. Es ergaben sich keine deutlichen Unterschiede in den einzelnen Fraktionen. In Gegenwart von Formiat beobachteten wir eine Hemmung der Ribonuclease.

2. Versuche mit Ribosenucleinsäure aus Tabakmosaikvirus

Die Herstellung erfolgte nach der Methode von Cohen und Stanley¹². Die Lösung des durch Ultrazentrifugierung gereinigten TMV wird hierbei mit NaCl versetzt, bis die Endkonzentration 0,1-*m*. ist. Durch Zugabe von einem

Tropfen Essigsäure wird das p_H auf 5 gebracht und dann 2 Min. auf 100° erhitzt. Man läßt die Lösung 24 Std. bei 4° C stehen und entfernt dann das ausgefallene Protein durch Zentrifugation. Die überstehende, nucleinsäurehaltige Lösung wird dialysiert und anschließend konzentriert, indem man die Lösung in der Dialysierhülle mit einem Ventilator anbläst.

Es wurden einige Sedimentations- und Diffusionsmessungen mit dem Präparat durchgeführt. Cohen und Stanley fanden für die Nucleinsäure eine Sedimentationskonstante von 7,7 bis 8,6 S. Beim Stehenlassen des Präparates zerfällt die Nucleinsäure spontan, wobei die Sedimentationskonstante auf Werte zwischen 3,4 und 5,7 sinkt. Unser Präparat verhielt sich in der Ultrazentrifuge uneinheitlich, für den Hauptteil ergab sich eine Sedimentationskonstante von 3,8 S. Die Diffusionskonstante lag zwischen 6 und 8,10⁻⁷ cm²/sec gegenüber einem Wert von 1,6 bis 5,2 bei Cohen und Stanley. Es soll versucht werden, ob es durch Variation der Herstellungsbedingungen nicht gelingt, auch ein der Größe nach einheitliches Präparat zu erhalten.

Die enzymatische Spaltung der Nucleinsäure wurde in gleicher Weise und parallel zur Hefenucleinsäure durchgeführt. Auch für die Papierelektrophorese wurden die gleichen Bedingungen gewählt.

¹² S. S. Cohen u. W. M. Stanley, J. biol. Chemistry **144**, 589 [1942].

Über bakterielle Reizstoffe

III. Mitt.: Physikalisch-chemisches Verhalten eines hochgereinigten Coli-Pyrogens

VON GERHARD SCHRAMM, OTTO WESTPHAL UND OTTO LÜDERITZ

Aus dem Max-Planck-Institut für Biochemie, Abt. Virusforschung, Tübingen, und den Dr. A. Wander-Laboratorien, Säckingen (Baden) und Bern (Schweiz)

(Z. Naturforschg. **7b**, 594–598 [1952]; eingegangen am 23. Oktober 1952)

Das in unserer I. und II. Mitteilung beschriebene pyrogene Lipopolysaccharid aus Colibakterien (Stamm Kröger, 0-Gruppe 8) verhält sich elektrophoretisch einheitlich. Die Ergebnisse der Untersuchungen mit der Ultrazentrifuge und dem Elektronen-Mikroskop lassen sich unter Berücksichtigung von Viskositäts- und Lichtstreuungsmessungen folgendermaßen deuten: Das Colipyrogen besteht aus sphärischen Grundeinheiten mit einem Teilchengewicht von rund 1 Million. In Lösung liegt aber nur ein Teil des Lipopolysaccharids in dieser Form vor. Ein großer Teil ist zu höheren Aggregaten vereinigt, die durchschnittliche Teilchengewichte von etwa 20 Millionen aufweisen. Die Aggregation der Grundeinheiten erfolgt bevorzugt in einer Richtung, so daß — besonders in alkalischer Lösung — lange perlschnurartige Gebilde entstehen können. Wegen der ausgeprägten Aggregationstendenz verhält sich die Substanz in Lösung hinsichtlich des Teilchengewichts nicht einheitlich.

In der I. und II. Mitteilung über bakterielle Reizstoffe^{1,2} wurde über die Extraktion und Reindarstellung eines Pyrogens aus *Bacterium coli* (Stamm

Kröger, 0-Gruppe 8) berichtet. Auf Grund der chemischen Analyse ergab sich, daß das hochwirksame Pyrogen einen Lipopolysaccharid-Symplex darstellt. Das Material ist völlig frei von Protein- und Amino-

¹ O. Westphal, O. Lüderitz, E. Eichenberger u. W. Keiderling, Z. Naturforschg. **7b**, 536 [1952].

² O. Lüderitz u. O. Westphal, Z. Naturforschg. **7b**, 548 [1952].

säure- sowie Nucleinsäure-Anteilen. Der Polysaccharidanteil ($\sim 75\%$) enthält 6—7% organisch gebundenes Phosphat. Die Substanz bildet opaleszierende wäßrige Lösungen. Hieraus konnte auf ein relativ hohes Teilchengewicht der gelösten Substanz geschlossen werden. Um über die Größe und Einheitlichkeit der gelösten Teilchen Aufschluß zu erhalten, wurden physikalisch-chemische Untersuchungen durchgeführt.

1. Elektrophorese

Die elektrophoretischen Untersuchungen wurden im Tiselius-Apparat mit einer modifizierten Beobachtungsmethode³ nach Philpot-Svensson durchgeführt. Eine 0,8-proz. Lösung des Colipyrogens (Präparat IV/F77S¹) in 0,1-n. Veronalpuffer vom p_H 8,6 ergab einen einzelnen scharfen Gradienten, der mit einer Beweglichkeit von $2 \cdot 10^{-5}$ cm²/Voltsec zur Anode wandert. Da im Polysaccharidanteil keinerlei saure Zuckerbausteine nachgewiesen werden konnten², dürfte der anionische Charakter der Substanz auf den Esterphosphat-Gruppen (6—7%) beruhen. *Hinsichtlich ihres Ladungszustandes erwies sich die Substanz also als einheitlich.* Um über die Einheitlichkeit hinsichtlich des Teilchengewichts und über dieses selbst Aufschluß zu erhalten, führten wir Messungen in der Ultrazentrifuge durch.

2. Sedimentation

In der Ultrazentrifuge (Phywe) zeigt das Präparat IV/F77S bei p_H 8 in $m/15$ -Phosphatpuffer einen einzelnen Gradienten, der jedoch sehr breit ist (Abb. 1). Die Teilchengröße ist also nicht einheitlich. In 1-proz. Lösung wurde eine Sedimentationskonstante $s_{20} = 193$ S gefunden; für ein ähnliches Präparat IV/F81¹ in 0,5-proz. Lösung ergab sich $s_{20} = 175$ S. Legt man die Sedimentationskonstante $s_{20} = 193$ S und, wie sich aus den weiter unten angeführten Viskositätsmessungen ergibt, einen Reibungsfaktor $f/f_0 = 2,6$ zugrunde, so erhält man für das durchschnittliche Teilchengewicht 24 Millionen. Neben den Teilchen dieser Größe sind in Lösung aber auch noch *höhere Aggregate* vorhanden, die so uneinheitlich sind und so schnell sedimentieren, daß eine Messung der Sedimentationskonstanten nicht möglich ist. Zur genauen Bestimmung des Teilchengewichts müßte auch die Diffusionskonstante der gelösten Substanz ermittelt werden. Diese Messung ist aber wegen der starken Lichtstreuung schwierig und die Deutung wegen der

Uneinheitlichkeit der Substanz unsicher. Wir haben deshalb darauf verzichtet.

Nachdem sich in der Ultrazentrifuge ein so hohes Teilchengewicht ergeben hatte, mußte es aussichtsreich erscheinen, den Durchmesser und die Gestalt der Partikel auch elektronen-optisch zu bestimmen.

3. Elektronenmikroskopische Untersuchungen

Das Coli-Pyrogen IV/F77S wurde in etwa 0,010-proz. wäßriger Lösung (p_H 7) auf die Folie aufgebracht und nach dem Trocknen mit Platin-Rhodium bedampft. Es wurde das elektrostatische Elektronen-

Abb. 1. Sedimentationsdiagramm des Coli-Pyrogens IV/F77S in $m/15$ -Phosphatpuffer, p_H 8. Konzentration: 1%; Drehzahl: 25 000 U/min; Skalenabstand: 5 cm; z = Skalenstrichverschiebung; x = Abstand vom Drehzentrum. Die Zahlen geben die Zeit in Minuten an, die seit Versuchsbeginn verfloßen ist.

mikroskop von AEG-Zeiß benutzt. Wie Abb. 2* zeigt, sind neben einzel-liegenden sphärischen Partikeln (durch Pfeil angedeutet) längere fadenförmige Aggregate zu erkennen. Ihre Länge erreicht teilweise das 20-fache des Durchmessers eines Einzelteilchens. Dieser beträgt etwa 10 μ ; er liegt also in der Nähe des Auflösungsvermögens des Elektronenmikroskops und kann infolgedessen nur angenähert angegeben werden. Aus dem Durchmesser berechnet sich bei Annahme eines spezifischen Gewichts der Substanz von 1,6 ein Teilchengewicht von rd. 1 Million.

Dieser Wert liegt wesentlich unter jenem, der sich aus der Sedimentationskonstante errechnet. Wir nehmen daher an, daß die Uneinheitlichkeit der Teilchen in der Ultrazentrifuge darauf beruht, daß die einzelnen Grundeinheiten mit dem Molekulargewicht von rund 1 Million, wie auf den elektronenoptischen

³ O. Armbruster, W. Kossel u. K. Strohmaier, Z. Naturforschg. 6a, 510 [1951].

* Abb. 2 u. 4, s. Tafel S. 596 a.

Aufnahmen, auch in Lösung zu höheren Aggregaten zusammentreten können.

4. Viskositätsmessung

Für eine Aggregation spricht auch die hohe Viskosität der Lösungen. Für die Eigenviskosität

$$[\eta] = \lim_{c \rightarrow 0} \frac{\eta_{\text{spez.}}}{c}$$

(c in g/l) ergab sich der Wert 0,80. Die Messungen wurden in einem Ostwald-Viskosimeter durchgeführt. Es wurden folgende Werte erhalten (Lösungsmittel: 0,9% NaCl, Temperatur 20°C):

Konzentration der Lösung in ‰	0,90	0,30	0,12	0,045
η relativ	1,92	1,24	1,104	1,043

Aus der Eigenviskosität 0,80 und dem spezifischen Volumen $V_0 = 0,6$ berechnet sich nach der Theorie von Simha⁴ eine *ellipsoide Gestalt* mit einem durchschnittlichen Achsenverhältnis von 1:40 und einem Reibungsfaktor $f/f_0 = 2,6$. Auch dieser Befund läßt sich mit den elektronenoptischen Beobachtungen vereinigen, wenn man annimmt, daß die Einzelteilchen sich zu kettenförmigen Gebilden aggregieren.

5. p_H -Abhängigkeit der Teilchengröße

Wir haben versucht, durch p_H -Veränderung die Aggregation zu variieren. Zu diesem Zweck wurde die Lichtstreuung der Pyrogen-Lösung in Abhängigkeit vom p_H untersucht. Da bei diesen großen Teilchen die Lichtstreuung die Absorption überwiegt, darf in erster Näherung die Extinktion als Maß der Streuung angesehen werden. Es zeigte sich, daß die Extinktion zwischen p_H 5 und 11 nach höheren p_H -Werten zu stark abnimmt (Abb. 3). *Im alkalischen Gebiet findet also eine Aufspaltung der Aggregate statt.* Dieser Effekt ist weitgehend, aber nicht vollständig reversibel, beruht also nicht auf einer Hydrolyse, sondern auf einer Änderung der Wechselwirkung der Grundeinheiten aufeinander. Die Desaggregation sollte auch in der Ultrazentrifuge nachweisbar sein. Deshalb wurden Sedimentationsversuche bei p_H 10 in $m/10$ -Soda-Bicarbonat-Puffer durchgeführt. Hierbei wurde in 0,5-proz. Lösung $s_{20} = 179$ S, also praktisch der gleiche Wert wie bei p_H 8 gefunden. Auch bei

diesem p_H war das Präparat nicht einheitlich. Das Absinken der Lichtstreuung bei hohem p_H ist vermutlich darauf zurückzuführen, daß nur jene großen Aggregate aufgelöst werden, die wegen ihrer zu hohen Sinkgeschwindigkeit in der Ultrazentrifuge nicht erfaßt werden konnten.

Es wurden nunmehr auch elektronenmikroskopische Aufnahmen bei p_H 10 gemacht. Vom Coli-Pyrogen IV/F77S wurde in Soda-Bicarbonat-Puffer vom p_H 10,0 eine 0,03-proz. Lösung hergestellt. Ein Tropfen hiervon wurde auf die Kollodiumfolie aufgebracht. vor dem Eintrocknen wurden die Puffersalze durch

Abb. 3. p_H -Abhängigkeit der Extinktion einer 1-proz. wäßrigen Lösung des Coli-Pyrogens. Lange-Kolorimeter, Filter: blaugrün.

wiederholtes Waschen mit destilliertem Wasser entfernt⁵ und die Präparate, wie oben beschrieben, bedampft.

Wie Abb. 4 zeigt, wurden bei p_H 10 zahlreiche Einzelteilchen beobachtet, die in ihrer Größe denen in Abb. 2 entsprechen. Daneben finden sich aber überraschenderweise lange, perlschnurartige Ketten, die teilweise parallel aneinander gelagert sind. Diese entstehen offenbar durch geordnete Aneinanderlagerung von Einzelteilchen; hierbei spielt sich vermutlich ein ähnlicher Vorgang ab wie bei der Bildung flüssiger Kristalle. — Diese Erscheinung ist in der Proteinchemie nicht selten. Es sei nur an die parakristallinen Nadeln des Tabakmosaikvirus oder an die geordnete Aggregation des globulären G-Aktins zum fibrillären F-Aktin⁶ erinnert. *Diese perlschnurartigen Aggregate finden sich mehr oder weniger ausgeprägt bei allen Aufnahmen, die von alkalischen Lösungen des Lipo-*

⁴ R. Simha, J. physical Chem. 44, 25 [1940]; E. J. Cohn u. J. T. Edsall, Proteins, Amino Acids and Peptides, Reinhold Publ. Corp., New York 1943, S. 519 ff.

⁵ Vgl. G. Schramm u. M. Wiedemann, Z. Naturforsch. 6b, 379 [1951].

⁶ R. W. G. Wyckoff, Electron microscopy, Interscience Publ., New York 1949.

Abb. 2. Coli-Pyrogen in Wasser (p_H 7), Vergrößerung 1 : 90 000. Schrägbedampfung mit Pt-Rh.

Abb. 4. Coli-Pyrogen bei p_H 10, Vergrößerung 1 : 90 000. Schrägbedampfung mit Pt-Rh.

Abb. 1. Tabakmosaikvirus, Leitbahnenexsudat, Pt-Beschattung (Werkphoto AEG-Zeiß). Vergrößerung 25 000 $\times$, bei der Reproduktion auf $\frac{3}{5}$ nachverkleinert.

Abb. 3. Kartoffel-X-Virus, Stamm M 23, Leitbahnenexsudat, Pt-Beschattung (Werkphoto AEG-Zeiß). Vergrößerung 30 000 $\times$, bei der Reproduktion auf $\frac{1}{2}$ nachverkleinert.

Abb. 2. Tabakmosaikvirus, Leitbahnenexsudat, Pt-Beschattung (Werkphoto AEG-Zeiß). Vergrößerung 45 000 $\times$, bei der Reproduktion auf $\frac{1}{2}$ nachverkleinert.

polysaccharid-Symplexes hergestellt wurden. Ob sich die geordneten Aggregate erst beim Eintrocknen der Lösung auf der Folie bilden oder schon in der verdünnten Lösung vorhanden sind, läßt sich nicht entscheiden.

Diskussion

In den vorhergehenden Mitteilungen über das hochgereinigte pyrogene Lipopolysaccharid aus Colibakterien^{1,2} haben wir auf die chemische Ähnlichkeit der Substanz mit einer Reihe von Polysaccharid-Symplexen anderer gramnegativer Bakterienspezies hingewiesen, nämlich mit den undegradierten Polysaccharid-Komponenten der somatischen O-Antigene von *B. shigae*, *B. typhosum*^{7,8} und *Shigella dysenteriae*⁹ und dem tumor-nekrotisierenden Polysaccharid aus *B. prodigiosus* (*Serratia marcescens*) von Shear¹⁰. Soweit sich über diese Polysaccharide in der Literatur Angaben bezüglich ihres physikalisch-chemischen Verhaltens in Lösung finden, läßt sich wiederum eine große Ähnlichkeit mit dem von uns dargestellten Polysaccharid-Pyrogen aus *E. coli* feststellen.

Morgan und Partridge haben gefunden, daß das mittels Formamids und Trypsinbehandlung aus dem 0-antigenen Symplex von *B. typhosum* dargestellte undegradierte Polysaccharid in Wasser klare Lösungen bildet; bei weiterer Fraktionierung unter Anwendung organischer Solventien nahm die Wasserlöslichkeit ab. Es wurden opaleszierende Lösungen erhalten, welche jenen von Stärke ähnelten. Dieses Material ergab mit Alkali wiederum klare Lösungen, die bei Neutralisation mit Säure (teilweise reversibel) wieder opaleszent wurden. Dies entspricht unseren Beobachtungen über die Lichtstreuung. Auch bei unserem Präparat schien mit zunehmender Reinigung die Aggregationstendenz in Lösung zuzunehmen. So braucht das hochgereinigte Lipopolysaccharid aus Colibakterien, trotz schonender Lyophil Trocknung, oftmals längere Zeit, um in destilliertem Wasser in Lösung zu gehen, und einzelne Partikel verschwinden nur sehr langsam.

Kahler, Shear u. Hartwell¹¹ haben das Verhalten des tumor-nekrotisierenden Polysaccharid-

Symplexes aus *B. prodigiosum* elektrophoretisch, mit der Ultrazentrifuge und elektronenoptisch untersucht. Das Polysaccharid zeigte eine starke Tendenz zur Aggregation. Shear und seine Mitarbeiter fanden, daß ihr Präparat praktisch aus einer Komponente bestand, welche in Lösung Teilchengewichte in der Größenordnung von 1—10 Millionen aufweist. In der Ultrazentrifuge erscheint das Polysaccharid von Shear, ebenso wie unser Präparat aus Colibakterien, inhomogen. Aus den elektronenoptischen Befunden wurden Teilchengewichte von 3—30 Millionen berechnet. Aus Diffusions- und Sedimentationsmessungen konnte ein Reibungsfaktor f/f_0 von 1,8 bestimmt werden, was einem Ellipsoid mit dem Achsenverhältnis 1:16 bis 1:21 entsprechen würde. Diese Werte deuten darauf hin, daß auch das Polysaccharid von Shear bevorzugt in einer Richtung aggregiert.

Das von uns untersuchte Coli-Pyrogen verhält sich sehr ähnlich. Die elektronenoptisch nachweisbaren kleinsten Teilchen mit einem Durchmesser von etwa 10 $m\mu$ bzw. einem Teilchengewicht von rund 1 Million sind in der Lösung nur zu einem geringen Prozentsatz vorhanden. Hierfür sprechen zunächst die Viskositätsmessungen, nach denen die gelösten Partikel nicht kugelförmig sein können, sondern größtenteils als langgestreckte Aggregate mit einem Achsenverhältnis von $\sim 1:40$ bzw. einem Reibungsfaktor von 2,6 vorliegen müssen. Auch in der Ultrazentrifuge finden wir eine Sedimentationskonstante, die zeigt, daß die meisten Partikel größer sind als die Grundeinheit mit einem Durchmesser von 10 $m\mu$. Legt man den viskosimetrisch ermittelten Reibungsfaktor zugrunde, so ergibt sich aus der Sedimentationskonstanten ein mittleres Teilchengewicht von 24 Millionen, was einem Aggregat aus 20—30 Grundeinheiten entspricht. *Die Uneinheitlichkeit in der Ultrazentrifuge ist durch die Unterschiede im Aggregationszustand der unter sich gleichen Untereinheiten bedingt.* Hierfür sprechen auch die elektrophoretischen Versuche, die eine einheitliche Beweglichkeit ergeben. Dies ist dadurch zu erklären, daß bei Längsaggregation das Verhältnis von Ladung zu Reibung konstant bleibt. Auf den elektronenmikroskopischen Aufnahmen ist die Aggregation der Grundeinheiten unmittelbar sichtbar. Bei p_H 8 erfolgt sie mehr oder weniger ungeordnet, bei p_H 10 führt sie dagegen zu ganz regel-

⁷ W. T. J. Morgan u. S. M. Partridge, Biochem. J. **34**, 169 [1940]; **35**, 1140 [1941].

⁸ W. T. J. Morgan u. S. M. Partridge, Brit. J. exp. Pathol. **23**, 151 [1942].

⁹ C. Tal u. W. F. Goebel, J. exp. Med. **92**, 25 [1950]; W. F. Goebel et al., J. exp. Med. **81**, 315, 331, 349 [1945].

¹⁰ M. J. Shear u. T. C. Turner, J. nat. Cancer Inst. **4**, 81 [1943]; J. L. Hartwell u. M. J. Shear, J. nat. Cancer Inst. **4**, 107 [1943].

¹¹ H. Kahler, M. J. Shear u. J. L. Hartwell, J. nat. Cancer Inst. **4**, 123 [1943].

mäßigen, sehr langen Ketten. Eine ganz ähnliche Abhängigkeit der Polymerisationsrichtung vom p_H findet man auch beim G-Actin¹². Wahrscheinlich sind bei hohem p_H die Richtungen, in denen eine Aggregation stattfinden kann, eingeschränkt. Die Regelmäßigkeit

der im alkalischen Gebiet gebildeten Ketten spricht dafür, daß die Grundeinheiten eine definierte und gleichartige Struktur besitzen.

Die elektronenmikroskopischen Untersuchungen wurden gemeinsam mit Herrn G. Berger, die Versuche in der Ultrazentrifuge mit Herrn P. Giebler und Frau U. John durchgeführt.

¹² W. E. Mommaerts, J. biol. Chemistry **198**, 439 [1952].

Elektronenmikroskopische Untersuchungen am Kartoffel-X- und Tabakmosaik-Virus

Von O. BODE und E. KÖHLER

Aus dem Institut für Virusforschung der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft in Celle

(Z. Naturforschg. **7b**, 598—600 [1952]; eingegangen am 17. Oktober 1952)

Mit dem von J. Johnson angegebenen, augenscheinlich besonders schonenden Präparationsverfahren zeigten die im Elektronenmikroskop dargestellten Partikel des Tabakmosaikvirus wie auch des Kartoffel-X-Virus in ihrer großen Mehrzahl einheitliche Längen, die man wohl als die Normallängen ansehen kann. Beim TMV wurde die Normallänge in Bestätigung der Befunde früherer Autoren bei 280—300 $m\mu$ angetroffen, beim X-Virus war sie für die zwei untersuchten Stämme verschieden. Sie fiel bei dem der X^N -Gruppe zugehörigen Stamm M 23 in die Größenklasse 600—620 $m\mu$, bei dem zur X^E -Gruppe gehörigen Stamm Cs 35/50 in die Größenklasse 560—580 $m\mu$.

Die Entwicklung der Elektronenmikroskopie hat das Viruspartikel in die Größenordnung der Beobachtungsmöglichkeit gerückt¹. Verschiedene Viren, insbesondere das Tabakmosaikvirus (TMV), wurde in vielen Arbeiten der letzten Jahre untersucht. Die Deutung elektronenmikroskopischer Aufnahmen ist jedoch stets dadurch erschwert, daß die Präparate nur im Vakuum und unter erheblicher Belastung untersucht werden können; dann aber bereitet auch schon die Präparation besondere Schwierigkeiten. Chemische Einwirkung und mechanische Belastung können zur Entstehung von Bruchstücken und zur Aggregation der Viruspartikel und damit zu Fehldeutungen führen. Erst in letzter Zeit ist es bei schonender Technik gelungen, Präparate weitgehend einheitlicher Partikellängen beim TMV zu erzielen². Da es nur zu Brüchen quer zur Längsrichtung kommt, ist die Dicke der Partikel nach bisherigen Erfahrungen keinen Schwankungen unterworfen. Ob von verschiedenen

Autoren beobachtete Feinstrukturen der Partikel (TMV: Johnson³; X-Virus: Kleczkowski und Nixon⁴) real sind, können erst weitere Untersuchungen klären, da bereits durch die übliche Bedampfung der Präparate eine gewisse Struktur vorgetäuscht werden kann. Neuerdings spricht sich Williams⁵ auf Grund seiner kritischen Untersuchungen bei hoher Auflösung gegen eine solche Struktur aus.

Johnson³ hat eine Methode zur Gewinnung von Präparaten für das Elektronenmikroskop beschrieben, die uns wegen ihrer Einfachheit, Vermeidung von chemischer Behandlung und Zentrifugation eine besonders schonende Behandlung der Viren versprach. Wir haben deshalb zunächst Präparate des TMV, die nach dieser Methode hergestellt waren, untersucht, um einen Überblick über ihre Brauchbarkeit zu gewinnen. Aus zwei Präparaten wurden insgesamt 213 TMV-Partikel vermessen. Das Ergebnis ist nach Größenklassen in Tab. 1, Spalte a, zusammengefaßt. Es zeigt sich, daß 203 Partikel, d. h. 88%, in die

¹ G. A. Kausche, E. Pfankuch u. E. Ruska, Naturwiss. **27**, 292—299 [1939].

² W. N. Takahashi u. T. E. Rawlins, J. Bacteriol. **57**, 131—134 [1949]; R. C. Williams u. R. L. Steere, J. Amer. chem. Soc. **73**, 2057—2066 [1951]; G. Schramm u. M. Wiedemann, Z. Naturforschg. **6b**, 379—383 [1951], u. andere.

³ J. Johnson, Phytopathology **41**, 78—93 [1951].

⁴ A. Kleczkowski u. H. L. Nixon, J. gen. Microbiol. **4**, 220—224 [1950].

⁵ R. C. Williams, Biochim. biophysica Acta **8**, 227—244 [1952].