(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Cr ⁺²	3 d ⁴	3 d ⁸ 4 s ² 4 p ⁶	2	2,83	[Cr ⁺² (C ₅ H ₅) ₂]	3,20 ± 0,16
Mn ⁺² Fe ⁺³	3 d ⁵	3 d ⁹ 4 s ² 4 p ⁶	1	1,73	[Mn ⁺² (C ₅ H ₅) ₂] [Fe ⁺³ (C ₅ H ₅) ₂] ⁺ J ⁻ ·2,25 J	2,10 ± 0,10 2,34 ± 0,12
Fe ⁺² Co ⁺³	3 d ⁶	3 d ¹⁰ 4 s ² 4 p ⁶ (Kryptonkonfiguration)	0	0	[Fe ⁺² (C ₅ H ₅) ₂] [Co ⁺³ (C ₅ H ₅) ₂] ⁺ +Br ⁻ [Co ⁺³ (C ₅ H ₅) ₂] ⁺ +ClO ₄ ⁻	0 0 0
Co ⁺² Ni ⁺³	3 d ⁷	3 d ¹⁰ 4 s ² 4 p ⁶ 4 d ¹	1	1,73	[Co ⁺² (C ₅ H ₅) ₂] [Ni ⁺³ (C ₅ H ₅) ₂] ⁺ + [B(C ₆ H ₅) ₄] ⁻	1,76 ± 0,07 1,82 ± 0,09
Ni ⁺²	3 d ⁸	3 d ¹⁰ 4 s ² 4 p ⁶ 4 d ²	2	2,83	[Ni ⁺² (C ₅ H ₅) ₂]	2,86 ± 0,11

(S Quantenzahl des Gesamtelektronenspins des Moleküls) die in Spalte (e) angegebenen Zahlen. Spalte (f) enthält die untersuchten Verbindungen und Spalte (g) die dabei experimentell erhaltenen magnetischen Momente.

Die Übereinstimmung der abgeleiteten magnetischen Momente mit den Meßwerten ist im allgemeinen sehr gut. Nur bei Cr(C₅H₅)₂, Mn(C₅H₅)₂ und Fe(C₅H₅)₂J·2,25J sind die gemessenen Momente etwas größer als die berechneten. Dies deckt sich mit den Werten für andere Cr⁺²-, Mn⁺²- und Fe⁺³-Komplexverbindungen von analogem Bau³. Das magnetische Moment des dem [Fe⁺³(C₅H₅)₂]⁺J⁻·2,25J analogen Kalium-ferri-cyanids K₃[Fe⁺³(CN)₆]⁻³ beträgt z. B. $\mu_{\text{eff}} = 2,33$ gegenüber obigem Wert von 2,34 für jenes. Es ist also anzunehmen, daß hier auch die Bahnmomente teilweise wirksam werden, da in diesen Fällen die nicht abgesättigte 3d-Schale durch die voll besetzten 4s- und 4p-Niveaus weitgehend gegen die Einwirkung der elektrischen Kristallfelder abgeschirmt ist, die Voraussetzung für reinen Spinmagnetismus also nicht mehr vorliegt. Die magnetischen Untersuchungen bestätigen somit die Vorstellung eines Durchdringungs-Komplexes für die Struktur dieser Cyclopentadien-Verbindungen von Übergangsmetallen völlig, so daß diese als weitgehend gesichert angesehen werden kann.

Herrn Prof. Dr. G. Joos bin ich für Anregung und wertvolle Ratschläge und die Bereitstellung von Institutsmaterial zu großem Dank verpflichtet. Herrn Dr. E. O. Fischer, Anorganisch-chemisches Institut der T.H. München, danke ich für die Überlassung von Substanzproben.

³ Vgl. Pierce W. S e l w o o d, Magnetochemistry, New York 1943, S. 146 ff.

Neue Wasserstoffverbindungen des Siliciums und des Phosphors Das Silylphosphin SiH₃·PH₃

Von G. Fritz

Institut für Siliciumchemie der Universität Marburg
(Z. Naturforschg. 8b, 776 [1953]; eingeg. am 13. Nov. 1953)

In früheren Untersuchungen¹ wurde gezeigt, daß man durch die thermische Spaltung von weniger stabilen Molekülen Atome und Radikale erzeugen kann, mit denen sich

z. B. in der Siliciumchemie verschiedenartige Reaktionen auslösen lassen. So wird die Umsetzung zwischen SiH₄ und C₂H₄ durch die beim SiH₄-Zerfall auftretenden Siliciumwasserstoffradikale und H-Atome bestimmt.

Die bei der Zersetzung des SiH₄ auftretenden reaktionsfähigen Zerfallsprodukte werden noch eine Anzahl anderer Reaktionen ermöglichen, so z. B. Umsetzungen mit Wasserstoff-Verbindungen anderer Elemente, die zu neuartigen Wasserstoff-Verbindungen führen können. Dieses Gebiet soll später ausführlich bearbeitet werden. Als Beispiel wurde bisher die Umsetzung zwischen SiH₄ und PH₃ untersucht. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sollen kurz mitgeteilt werden. PH₃ ist thermisch wesentlich beständiger als SiH₄. Die thermische Zersetzung des PH₃ wird erst oberhalb 550°C meßbar, während die Zersetzung des SiH₄ schon bei 400°C deutlich festzustellen ist. Bringt man gleiche Teile PH₃ und SiH₄ bei 450°C und einem Druck von etwa 200 mm Hg in ein geschlossenes, vorher sorgfältig evakuiertes Reaktionsgefäß, so beobachtet man bereits nach etwa 30 Min. die Bildung von dampfförmigen und flüssigen Umsetzungsprodukten. Letztere scheiden sich als klare Tröpfchen an den kälteren Teilen des Reaktionsgefäßes ab. Kondensiert man zunächst die Ausgangsstoffe und Reaktionsprodukte in flüssigem Stickstoff und vertauscht dann dieses Kühlbad gegen eines von -80°C, so sieden bei Atmosphärendruck die Ausgangsstoffe PH₃ (Sdp. -87,5°C) und SiH₄ (Sdp. -112°C) ab, so daß die Umsetzungsprodukte zurückbleiben. Man erhält leichter flüchtige und höher siedende Flüssigkeiten, die sich bei der Berührung mit Luft sofort entzünden und beim Abbrennen weiße und braune Beschläge bilden. In diesen ist sowohl Phosphor als auch Silicium nachweisbar. Das Abbrennen geht stets ruhig vonstatten, und es wurden nie Explosionen beobachtet, wie man sie vom Si₂H₆ kennt. Die erhaltenen Produkte reduzieren spontan Lösungen von AgNO₃. Mit Alkalien tritt heftige Gasentwicklung ein, wobei sich H₂, SiH₄, PH₃ bilden und Kieselsäure abscheidet.

Um zunächst einmal die einfacheren Umsetzungspro-

¹ G. Fritz u. H. Kautsky, Z. Naturforschg. 5b, 395 [1950]; G. Fritz, Z. angew. Chem. 63, 489 [1951]; Z. Naturforschg. 7b, 207 [1950]; Z. Naturforschg. 7b, 507 [1952]; Z. anorg. allgem. Chem. 273, 275 [1953].

dukte untersuchen zu können, wurden die Reaktionsbedingungen so gewählt, daß der Zerfall der einmal gebildeten Reaktionsprodukte möglichst vermieden wurde. Um dies zu erreichen, durchströmt ein Gemisch aus gleichen Teilen PH_3 und SiH_4 ein auf 500°C erhitztes Reaktionsgefäß. Die aus dem Reaktionsgefäß austretenden Gase werden sofort in flüssigem N_2 abgeschreckt und der gebildete Wasserstoff abgepumpt. Auf diese Weise läßt sich die Bildung der höhersiedenden Umsetzungsprodukte etwas zurückdrängen, und es ist möglich, unter den aus PH_3 und SiH_4 erhaltenen Stoffen eine um Zimmertemperatur siedende, klare, tiefschmelzende Flüssigkeit zu isolieren. Dieses Produkt besitzt die vorher beschriebenen qualitativen Eigenschaften. Die Analyse liefert innerhalb der Fehlergrenzen das Atomverhältnis $\text{P}:\text{Si} = 1:1$. Das Molekulargewicht wurde in mehreren Messungen sorgfältig bestimmt und beträgt 64. Mit NH_4OH liefert die Substanz an gasförmigen Produkten H_2 , PH_3 und SiH_4 . Es liegt die Verbindung SiH_3PH_2 (theor. Mol.-Gew. 64), das *Silylphosphin*, vor.

Eine ausführliche Mitteilung über diese Untersuchung erfolgt demnächst.

Vor wenigen Tagen wurden uns die Untersuchungsergebnisse von B. J. Aylett, H. J. Emeléus und A. G. Maddock² über die Umsetzung von SiH_3J mit weißem Phosphor zu $\text{P}(\text{SiH}_3)_2\text{J}$ und $\text{P}(\text{SiH}_3)_3$ bekannt. Deshalb soll die Mitteilung unserer bisherigen Ergebnisse nicht länger unterbleiben.

² B. J. Aylett, H. J. Emeléus u. A. G. Maddock, *Research* (London) Vol. 6, Nr. 4, 30 S [1953]; *C. A.* Vol. 47, Nr. 16, 8570 [1953].

Reaktionen des Natriums mit Phosphor im flüssigen Ammoniak

Von Paul Royen und Werner Zschaage

Institut für anorganische Chemie

der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt a. M.

(*Z. Naturforschg.* 8b, 777 [1953]; eingeg. am 25. Nov. 1953)

Bei der Fortführung unserer früheren Arbeiten¹, welche von 1938 bis 1951 aus äußeren Gründen unterbrochen werden mußten, untersuchten wir das Verhalten von farblosem Phosphor gegenüber Natrium in flüssigem Ammoniak. Derartige Reaktionen wurden in neuerer Zeit auch von Evers und Mitarbb.^{2,3,4} untersucht. Sie stellten fest, daß das in flüssigem Ammoniak gelöste Natrium sich mit farblosem Phosphor im Atomverhältnis $2\text{Na}:1\text{P}$ quantitativ umsetzt. Das entstandene Solvat enthält nach ihrer Feststellung pro Formeleinheit Na_2P noch ein Molekül Kristallammoniak, das sich bei Zimmertemperatur nicht abpumpen läßt. Aus valenzchemischen Gründen sprechen sie die orangegelbe Substanz als ein Ammoniakat des Tetranatriumdiphosphids der Formel $\text{Na}_4\text{P}_2 \cdot 2\text{NH}_3$ an. Sie stützen diese Formulierung weiterhin auf den von ihnen beobachteten Verlauf der Reaktion mit Ammo-

niumbromid in flüssigem Ammoniak, wobei die entstehenden Reaktionsprodukte als sekundäre Zersetzungsprodukte des in Freiheit gesetzten Diphosphins aufgefaßt werden. In flüssigem Ammoniak zerfällt Diphosphin selbst dementsprechend in Phosphin und eine rötlich gefärbte Lösung, aus der anscheinend das von Stock und Mitarbb.⁵ beschriebene Ammoniumsalz des P_3H_2 durch Eindampfen zu erhalten ist. Wenn sie das Diphosphid unter Zugabe von gelöstem Natrium mit Ammoniumbromid umsetzten, so ließ sich die eintretende Reaktion wie folgt wiedergeben:

Nach der 1938 erfolgten Darstellung eines Ammoniumpolyphosphides aus PH_3 und Phosphor in flüssigem Ammoniak interessierten uns bei der Wiederaufnahme dieses Arbeitsgebietes die entsprechenden Natriumverbindungen, die wir direkt aus den Elementen im gleichen Reaktionsmedium herstellen wollten. Es ist das Verdienst von Evers und seinen Mitarbb., festgestellt zu haben, daß in diesem Falle ein Salz des Diphosphins entsteht.

Wir haben das entstehende Primärprodukt ebenfalls untersucht, wobei wir von elementarem Natrium und ein-sublimiertem Phosphor ausgingen. Bereits bei der Umsetzung treten in der Lösung kleine, farblose Kristalle auf, die auf Grund einer Debye-Scherrer-Aufnahme nach Abtrennung von der Lösung als Natriumamid identifiziert wurden. Verzichtet man auf diese Abtrennung, so zeigt nach Entfernung des flüssigen Ammoniaks der Rückstand ebenfalls die Linien des Natriumamids. Die Analyse des Rückstandes ergab in diesem Falle 49,5% Natrium und 31,1% Phosphor. Die von Evers und Mitarbb. gegebene Formulierung der Verbindung fordert 48,9% Na und 32,97% P. Wir vermuteten daher, daß nicht das Ammoniakat $\text{Na}_4\text{P}_2 \cdot 2\text{NH}_3$ vorliegt, sondern ein Gemisch von $\text{Na}_2\text{H}_2\text{P}_2 + 2\text{NaNH}_2$, welches die gleiche analytische Zusammensetzung hat. Diese Formulierung erklärt zugleich die Stabilität des „Ammoniakates“.

Filtrierte man die Lösung von dem in flüssigem Ammoniak schwer löslichen Natriumamid ab, so hinterbleibt beim Eindampfen ein orangegelb gefärbter Körper mit 39,5% Na und 54,4% P. Dies ergibt ein Atomverhältnis $\text{Na}:\text{P} = 1:1,023$. Die theoretischen Werte für $\text{Na}_2\text{H}_2\text{P}_2$ sind 41,80% Na, 56,37% P und 1,83% H. Diese Ergebnisse zeigen, daß anscheinend primär gebildetes Na_4P_2 ammonolytisch in $\text{Na}_2\text{H}_2\text{P}_2$ und 2NaNH_2 zerfällt. Die oben erwähnte Reaktion des Diphosphids mit Natrium und Ammoniumbromid kann jetzt folgendermaßen geschrieben werden:

Evers und Mitarbb. teilen in ihrer zweiten Arbeit³ mit, daß bemerkenswerterweise eine Lösung, die etwa 2 Mol. NH_4Br auf 1 $\text{Na}_4\text{P}_2 \cdot 2\text{NH}_3$ enthält, mit Natrium nicht reagiert. Sie erklären dies damit, daß das gebildete $\text{Na}_2\text{H}_2\text{P}_2$ bzw. das $\text{P}_2\text{H}_2^{2-}$ -Ion nicht durch Natrium redu-

¹ P. Royen, *Z. anorg. allgem. Chem.* **235**, 324 [1938].

² E. Ch. Evers, *J. Amer. chem. Soc.* **73**, 2038 [1951].

³ E. Ch. Evers, E. H. Street, Jr. u. S. L. Jung, *J. Amer. chem. Soc.* **73**, 5088 [1951].

⁴ E. Ch. Evers u. J. M. Finn, *Jr. J. phys. Chem.* **57** (6), 559 [1953].

⁵ A. Stock, W. Böttcher u. W. Lenger, *Ber. dtsch. chem. Ges.* **42**, 2853 [1909].