Fabiatriin, ein Inhaltsstoff der Wurzeln von *Petunia hybrida*

LEONHARD BIRKOFER, CHRISTELMARGOT KAISER
und GIOVANNI ROMUSSI¹

Institut für Organische Chemie der Universität Köln

(Z. Naturforschg. 22 b, 227–228 [1967]; eingegangen am 30. Juli 1966)

In den Petalen von *Petunia hybrida*² und vielen anderen Solanaceen dominieren als phenolische Substanzen Anthocyane, Flavonglykoside und Zuckerester von Hydroxyzimtsäuren. Wurzeln, Stengel und Blätter der Vertreter dieser Familie führen dagegen häufig Cumarin-Derivate³. Die von uns untersuchten Wurzeln verschiedener Petuniensorten zeigen bezüglich ihrer phenolischen Inhaltsstoffe ein einheitliches Bild. Sie enthalten alle nur ein Scopoletin-glykosid sowie in geringer Menge auch das Aglykon.

Durch Säulenchromatographie an Polyamid bzw. Kieselgel konnten beide in kristalliner Form isoliert werden. Die saure Hydrolyse des Glykosids mit 2-proz. Salzsäure lieferte Scopoletin (7-Hydroxy-6-methoxycumarin), Glucose und ein Zwischenprodukt, das als Scopolin (Scopoletin-7-glucosid) identifiziert wurde. Ein weiteres Zwischenprodukt erhielten wir durch partielle Hydrolyse sowohl mit 10-proz. Essigsäure als auch durch enzymatische Spaltung mit Emulsin. Es handelte sich um das erwartete Disaccharid, das sich durch papierchromatographischen und elektrophoretischen Vergleich als Primverose [O- β -D-Xylopyranosyl-(1 $\rightarrow$ 6)-d-glucopyranose] erwies.

Die gewonnenen experimentellen Befunde sowie der Schmp. des Glykosids (230°) und seine optische Drehung $[\alpha]_D^{20} = -142^\circ$ ($c = 0,5$; Wasser) sprachen für Scopoletin-7- β -primverosid. Dieses Cumarin-Derivat wurde erstmals aus den Zweigen von *Fabiana imbricata* gewonnen und unter dem Namen Fabiatriin in der Literatur⁴ bekannt. Seine Struktur klärten später CHAUDHURY, HOLLAND und ROBERTSON⁵ durch Synthese auf. Die von uns ermittelten Daten stimmen mit denen des synthetischen Produktes überein.

Einen weiteren Beweis für die Konstitution lieferten NMR-Spektren des Fabiatriins und der Primverose. Die OH-Protonen im Fabiatriin ersetzten wir durch Deute-

rium und nahmen das Spektrum in deuteriertem Dimethylsulfoxyd (Deuterierungsgrad ca. 98%) auf, dessen Signal bei 151 Hz als Bezug für die nachfolgend angegebenen Werte dient. Die Protonen des Cumarinringes finden sich bei 1,90 bis 3,90 τ . Die olefinischen Protonen in 3- und 4-Stellung des α -Pyronringes (H-3 = 2,01 τ ; H-4 = 3,66 τ) bilden jeweils ein Dublett mit einer Aufspaltung von 10,0 Hz (*cis*-Kopplung). Das Proton am C-8-Atom ($\tau = 2,70$) ist weniger abgeschirmt als das des C-5-Atoms ($\tau = 2,78$) und erscheint demnach bei niedrigerem Feld. Die drei Protonen der Methoxygruppe weisen ein scharfes Signal bei 6,18 τ auf. Die beiden anomeren Protonen der Glucose und der Xylose (der Integrationswert entspricht jeweils einem Proton) sind bei 4,90 τ und 5,83 τ zu erkennen. Beide zeigen die für biaxiale transständige Protonen im Pyranring typische Aufspaltung von 7 Hz, was bestätigt, daß sowohl die Glucose als auch die Xylose β -glykosidisch verknüpft sind.

Im NMR-Spektrum der in deuteriertem Dimethylsulfoxyd gelösten Primverose liegen die Signale des anomeren Protons der Glucose bei 5,06 τ ($J_{ae} = 3$ Hz) und der Xylose bei 5,84 τ ($J_{aa} = 6$ Hz). Auch aus weiteren NMR-Spektren des Disaccharids, u. a. des Trimethylsilyl-Derivates geht hervor, daß die Primverose in der α -Form vorliegt.

Beschreibung der Versuche

Etwa 1 kg gewaschene Wurzeln von *Petunia hybrida* wurden in ca. 2 l 90-proz. Methanol eingelegt, mehrere Tage bei 0° aufbewahrt und die Extraktion mit jeweils 2 l 90-proz. Methanol so lange wiederholt (5 bis 7-mal), bis die Lösung nur noch schwache Fluoreszenz im UV-Licht aufwies. Die vereinigten Extrakte engte man auf ungefähr ein Zwanzigstel des Gesamtvolumens im Vakuumrotationsverdampfer (Badtemperatur 30°) ein und schüttelte die nunmehr wäßrige Lösung mehrmals mit jeweils 100 ml Chloroform aus.

Nach dem Trocknen (Na_2SO_4) konzentrierte man auf etwa 10 ml, brachte das Konzentrat auf eine Kieselgelsäule (Φ 3 cm, Länge 50 cm; E. Merck, Korngröße 0,2–0,5 mm) und fraktionierte durch Elution mit Äther. Die einzelnen Fraktionen wurden papierchromatographisch geprüft. Aus den Eluaten, die im UV-Licht leuchtend hellblau fluoreszierten, kristallisierte das Scopoletin ($R_f = 1^*$) nach dem Einengen und Animpfen in feinen Nadeln aus. Ausbeute 25 Milligramm. Der Schmp. (197,5–199°), das UV-Spektrum (λ_{max} 230; 255; 299; 348 m μ in Methanol) sowie der R_f -Wert stimmten mit authentischem Scopoletin überein.

¹ Stipendiat des akademischen Auslandsamtes der Universität Köln. Ständige Adresse: Dr. G. ROMUSSI, Istituto di Chimica Farmaceutica, Genova/Italien.

² L. BIRKOFER, CH. KAISER u. H. KOSMOL, Naturwissenschaften 47, 469 [1960]; L. BIRKOFER u. CH. KAISER, Z. Naturforschg. 17b, 359 [1962]; L. BIRKOFER u. CH. KAISER, Z. Naturforschg. 17b, 279 [1962]; L. BIRKOFER, CH. KAISER, W. KOCH u. H. W. LANGE, Z. Naturforschg. 18b, 367 [1963]; L. BIRKOFER, CH. KAISER, W. KOCH, M. DONIKE u. D. WOLF,

Z. Naturforschg. 18b, 631 [1963]; L. BIRKOFER, CH. KAISER, M. DONIKE u. W. KOCH, Z. Naturforschg. 20b, 424 [1965].

³ J. B. HARBORNE, Biochem. J. 74, 270 [1960].

⁴ G. R. EDWARDS u. G. ROGERSON, Biochem. J. 21, 1010 [1927].

⁵ D. N. CHAUDHURY, R. A. HOLLAND u. A. ROBERTSON, J. chem. Soc. [London] 1948, 1671.

* Sämtliche R_f -Werte beziehen sich auf Scopoletin mit $R_f = 1$ in n-Butanol–Eisessig–Wasser (4:1:2); Papiersorte: Schleicher & Schüll 2043 b Mgl, Keilstreifen.

Die wäßrige Phase wurde auf etwa 10 ml eingengt und das Konzentrat auf eine Säule (ϕ 3 cm, Länge 100 cm) mit Polyamidpulver (Ultradpulver der Badischen Anilin- und Sodafabrik), das vorher mit Methanol, 10-proz. Essigsäure und Wasser gewaschen wurde, gebracht. Als Elutionsmittel diente Wasser; die einzelnen Fraktionen wurden papierchromatographisch geprüft, und die das Diglykosid Fabiatriin ($R_f = 0,34$) enthaltenden Fraktionen im Vakuumrotationsverdampfer eingengt. Nach mehrtägigem Stehen bei 0° (manchmal schon beim Einengen) schieden sich winzige Nadeln aus, deren Schmp. nach zweimaligem Umkristallisieren aus Äthanol bei 230° lag. Ausbeute 250 Milligramm.

$C_{21}H_{26}O_{13} \cdot 2 H_2O$ (522,5)

Ber. C 48,27 H 5,78,

Gef. C 48,32 H 5,95.

Das Kristallwasser kann auch durch Trocknen bei 95° (2–3 Torr) nicht vollständig entfernt werden.

Hydrolyse: a) Etwa 5 mg Fabiatriin wurden in 1 ml 2-proz. Salzsäure zum Sieden erhitzt und der Verlauf der Hydrolyse papierchromatographisch verfolgt. Bereits nach 5 Min. konnten neben Scopoletin ($R_f = 1$) und Glucose ($R_f = 0,22$) vor allem Scopolin ($R_f = 0,59$) und Xylose ($R_f = 0,33$) nachgewiesen werden. Nach ungefähr 40 Min. war die Spaltung in die Komponenten vollständig.

b) Etwa 10 mg Fabiatriin erhitzte man in 2 ml 10-proz. Essigsäure 6 Stdn. lang im siedenden Wasserbad. Die Hydrolyselösung, die als Hauptprodukte Primverose und Scopoletin enthielt, wurde zur Ent-

fernung des Aglykons mehrmals mit Chloroform ausgeschüttelt und die wäßrige Phase zum papierchromatographischen und papierelektrophoretischen Vergleich mit synthetischer Primverose⁶ herangezogen.

c) Die Spaltung mit Emulsin (Firma Dr. Th. Schuchardt, München) wurde in einem Acetatpuffer (p_H 5,3) bei 30° in 4 Tagen durchgeführt.

Elektrophorese: Der elektrophoretische Vergleich der aus Fabiatriin isolierten Primverose mit einem authentischen Präparat erfolgte in einem Boratpuffer (15 g Borsäure in 2,5 l Wasser gelöst und potentiometrisch mit Natronlauge auf p_H 9,5 eingestellt). Elektrophoreseapparat: LKB Type 3276 B; Spannung 350 V, 10 mA; Papiersorte: Schleicher & Schüll 2043 b Mgl, Elektrophoresedauer 6 Stdn.; Elektrophoresewerte: 2.3.4.6-Tetramethyl-glucose = 0; Glucose = 100; Primverose = 74.

Deuterierung: 60 mg Fabiatriin wurden in 3 ml D_2O unter Zusatz von 0,02 ml Eisessig in der Wärme (60°) gelöst und bis zur beginnenden Kristallisation (etwa 30 Min.) bei 20° belassen. Dann wurde im Vakuumrotationsverdampfer eingedampft, der Vorgang nochmals wiederholt, und der Rückstand in 0,4 ml deuteriertem Dimethylsulfoxyd aufgenommen.

Silylierung: 55 mg Primverose gab man zu einer Mischung von 2 ml *N*-Methyl-*N*-trimethylsilylacetamid⁷ und 0,02 ml Trimethylchlorsilan und brachte sie durch gelegentliches Schütteln zunächst bei 0° (30 Min.) und dann bei 20° zur klaren Lösung (mehrere Stdn.). Überschüssiges Silylierungsmittel und rückgebildetes *N*-Methylacetamid wurden bei 80° (0,5 Torr) entfernt und der Rückstand in 0,5 ml Tetrachlorkohlenstoff gelöst.

⁶ B. HELFERICH u. H. RAUCH, Liebigs Ann. Chem. **455**, 168 [1927].

⁷ Über die Silylierung mit *N*-Methyl-*N*-trimethylsilylacetamid s. L. BIRKOFER u. M. DONIKE, J. Chromatography, im Druck.