NOTIZEN

Zum Mechanismus von Kontakteliminierungen

XV. HCl-Eliminierung aus gasförmigem 2-Chlor-2-D-Propan an Sulfatkatalysatoren *

A. CORREA, M. HUNGER und H. NOLLER **

Escuela de Física y Matemáticas, Universidad Central de Venezuela, Caracas

(Z. Naturforsch. 23 b, 275 [1968]; eingegangen am 21. Oktober 1967)

Die Eliminierungs-Reaktionen von 2-Chlorpropan und 2-Chlor-2-D-Propan an den Katalysatoren MgSO_4 , CaSO_4 und BaSO_4 (11 Std. bei 150°C unter 1 mm Hg Luft vorbehandelt) wurden mikrokatalytisch und massenspektrometrisch untersucht (Katalysatorenvolumen: ca. $1,5\text{ cm}^3$ Pulver; Trägergas: Helium; Strömungsgeschwindigkeit: 60 ml/min; Massenspektrometer: CEC 21-620).

Der Umsatz der deuterierten Substanz lag immer unter dem der nicht deuterierten (maximale Verminderung 6%). Die Umsatz-Temperatur-Kurven selbst verschoben sich mit zunehmendem Kationenradius zu höheren Temperaturen (MgSO_4 : 150° bis 300°C ; CaSO_4 : 180° bis 320°C ; BaSO_4 : 250° bis 400°C). Mit gleicher Tendenz veränderten sich die Aktivierungsenergien (undeuterierter Reaktant: MgSO_4 : 13 kcal/Mol; CaSO_4 :

16,3 kcal/Mol; BaSO_4 : 22,3 kcal/Mol). Die hier gefundenen Ergebnisse, daß die Aktivität der Katalysatoren mit zunehmendem Ionenradius abnimmt, stimmt mit den über die Eliminierungs-Reaktionen entwickelten Vorstellungen überein ***. Die Erhöhung der Aktivierungsenergien beim deuterierten Reaktanten (MgSO_4 : 12,5%; CaSO_4 : 8,5%; BaSO_4 : 4%) dürften im wesentlichen auf geringe Verunreinigungen der Ausgangssubstanz (nach IR- und NMR-Messungen bis zu 5% Aceton) zurückzuführen sein.

Die Massenspektren des aus dem (zu 98%, nach Angabe der Lieferfirma C. Roth, Karlsruhe) deuterierten Reaktanten gebildeten Reaktionsproduktes waren – unter Ausschluß der Massenpeaks $m/e = 14, 16$ und 28 für alle Katalysatoren im Temperaturbereich hohen Umsatzes (MgSO_4 : 68 bis 94%; CaSO_4 : 57 bis 90%; BaSO_4 : 49 bis 85%) gleich (mittlere Abweichung: 1%). Nur die Intensität der Masse $m/e = 29$ schien eine Ausnahme zu bilden (MgSO_4 : 3%; CaSO_4 : 7,5%; BaSO_4 : 10% des Referenzpeaks). Rund 94% des gebildeten Reaktionsproduktes enthielten ein Deuteriumatom (MgSO_4 : 93,5%; CaSO_4 : 94,5%; BaSO_4 : 95%). Demnach fand sich das in der Ausgangssubstanz vorhandene Deuterium in dem bei der Eliminierung gebildeten Propen beinahe vollständig wieder.

* XIV. Mitteilung: P. ANDRÉU, M. ROSA-BRUSIN, C. SÁNCHEZ, u. H. NOLLER. Z. Naturforsch. 22 b, 814 [1967].

** Anschrift auch: Physikalisch-Chemisches Institut der Universität München.

*** P. ANDRÉU, M. ROSA-BRUSIN, C. SÁNCHEZ u. H. NOLLER, Z. Naturforsch. 22 b, 809 [1967].

Chelate von β -Diketonderivaten IX ¹

Komplexverbindungen des Monothiodibenzoylmethans mit Platin- und Eisenmetallen

E. UHLEMANN und PH. THOMAS

Institut für Anorganische Chemie der Karl-Marx-Universität Leipzig

(Z. Naturforsch. 23 b, 275–277 [1968]; eingegangen am 19. Oktober 1967)

In Fortsetzung vorangehender Arbeiten über die Metallchelate des Monothiodibenzoylmethans ^{1–3} wurde die Reaktivität dieses Liganden gegenüber Metallen der Platin- und Eisengruppe untersucht und die Chelate von Ruthenium(III), Ruthenium(IV), Osmium(III), Osmium(IV), Eisen(II), Eisen(III), Kobalt(II), Mangan(II) und Vanadyl dargestellt.

Bei der Umsetzung von Monothiodibenzoylmethan mit Kaliumhexachlororuthenat(IV) bzw. -osmat(IV) konnten in Abhängigkeit von den Versuchsbedingungen sowohl Tetrakis-Chelate der vierwertigen Metalle als auch Tris-Chelate von Ruthenium(III) und Osmium(III) erhalten werden. Dagegen reagiert Hexachloroplatin(IV)-Säure stets unter Reduktion des Zentralions zum bekannten Chelat des Platin(II).

In den Ruthenium(IV)- und Osmium(IV)-Chelaten des Monothiodibenzoylmethans betätigen beide Platinmetalle die Koordinationszahl 8. Im magnetischen Verhalten zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede, die Osmiumverbindung weist ein magnetisches Moment von $\mu_{\text{eff}} = 1,89$ B.M. auf, das Rutheniumchelat ist diamagnetisch. Bei oktaedrischen Osmium(IV)-Verbindungen liegen die magnetischen Momente im Bereich von $1,2$ – $1,7$ B.M., der für zwei ungepaarte Elektronen er-

¹ VIII. Mitt.: E. UHLEMANN u. PH. THOMAS, Z. anorg. allg. Chem., im Druck.

² E. UHLEMANN, G. KLOSE u. H. MÜLLER, Z. Naturforsch. 19 b, 962 [1964].

³ E. UHLEMANN u. W. W. SUCHAN, Z. anorg. allg. Chem. 342, 41 [1966].

wartete reine Spinwert von 2,84 B.M. wird wegen der beträchtlichen Spin-Bahn-Kopplung nicht erreicht⁴. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache ist auch für den Osmium(IV)-Komplex des Monothiodibenzoylmethans auf das Vorliegen von zwei ungepaarten Elektronen zu schließen.

Als geometrische Anordnungen für achtfach koordinierte Komplexe sind in erster Linie Dodekaeder und Archimedisches Antiprisma zu diskutieren. Nach den Aufspaltungsdiagrammen der d-Einelektronenzustände in Ligandenfeldern dieser Symmetrie⁵ resultieren für d⁴-Ionen in beiden Fällen zwei ungepaarte Elektronen. Dagegen erscheint der Diamagnetismus des dargestellten Ruthenium(IV)-Komplexes mit einer dodekaedrischen oder antiprismatischen Struktur nicht vereinbar, könnte aber durch das Vorliegen einer Würfelsymmetrie mit der Elektronenverteilung (e_g^4 , t_{2g}^0) zwanglos erklärt werden. Bei Komplexverbindungen wurde dieser Strukturtyp jedoch bisher noch nicht nachgewiesen, deshalb müssen weitere Aussagen der in Angriff genommenen Röntgenstrukturanalyse vorbehalten bleiben.

Die Metallchelate I, III und V bis IX sind nur präparativ zugänglich, wenn die Reaktionstemperatur niedrig gehalten wird (10–25 °C). Bei höheren Temperaturen oder bei ungenügender Abführung der Reaktionswärme kommt es in allen Fällen zu Redox-Reaktionen

mit Wertigkeitsänderung des Zentralions und Bildung des Disulfids.

Bei der Darstellung des Kobalt(II)-Chelates (V) wurde gefunden, daß geringe Mengen Chlorid und Bromid katalytisch die spontane quantitative Bildung zum bereits bekannten Kobalt(III)-Chelat auslösen. Aus *siedender* alkoholischer Lösung erhält man stets ausschließlich die Kobalt(III)-Verbindung. Auch bei Zimmertemperaturen wandelt sich V in Lösung langsam in sein Kobalt(III)-Analogon um. V hat ein magnetisches Moment von 4,02 B.M. (297 °K) und liegt damit an der unteren Grenze der für tetraedrische Kobalt(II)-Hochspin-Komplexe gefundenen Werte von 4,1–4,7 B.M.⁶

Im Vanadylkomplex des Monothiodibenzoylmethans erreicht das Vanadiumzentration durch Anlagerung eines Wassermoleküls oktaedrische Koordination. Im IR-Spektrum lassen darauf folgende charakteristische Banden schließen:

$\nu(\text{V}=\text{O})$ 1003 s; $\nu(\text{C}=\text{C})$ 1525 s; $\nu(\text{C}=\text{O})$ 1588 m;

Im Gegensatz dazu ist in den β -Diketonkomplexen des Vanadyls eine tetragonal-pyramidale Anordnung ohne

Nr.	Verbindung*	Farbe Kristallisation	Schmp. ** [°C]	Magnetisches Moment [B. M.]	Analysenwerte [%]			
					ber.		gef.	
I	RuL ₄	braun (Methanol/Wasser)	80–84	diamagnetisch	Ru	9,56	Ru	9,22
II	RuL ₃	schwarz (n-Heptan)	220 (Z)	ESR: S = $\frac{1}{2}$	S	12,12	S	12,32
					Ru	12,36	Ru	12,03
III	OsL ₄	schwarz (n-Heptan)	71 (Z)	1,89	S	11,74	S	11,92
					Os	16,56	Os	16,14
IV	OsL ₃	schwarz (n-Butanol)	210 (Z)	1,66	S	11,18	S	11,52
					Os	20,95	Os	20,87
V	CoL ₂	braun	238–238	4,02	S	10,59	S	10,58
					Co	10,97	Co	10,90
VI	VOL ₂ · H ₂ O	grün (Chloroform/Petroläther)	240 (Z)	1,72	S	11,93	S	11,72
					C	67,00	C	66,67
					H	4,12	H	4,30
					C	63,90	C	64,20
VII	FeL ₃	schwarz (Chloroform/Petroläther)	152–154	5,42	H	4,26	H	4,04
					S	11,38	S	11,71
					Fe	7,22	Fe	7,25
					C	69,85	C	69,74
VIII	FeL ₂ · Py ₂	schwarzgrün (Pyridin/Wasser)	110 (Z)	5,34	H	4,30	H	4,22
					S	12,44	S	12,67
					Fe	8,06	Fe	8,18
					S	9,25	S	9,42
IX	MnL ₂ · Py ₂	dunkelgrün (Pyridin/Wasser)	102–105	6,09	N	4,04	N	4,14
					Mn	7,95	Mn	8,12
					S	9,28	S	9,16
					N	4,05	N	4,22

Tab. 1. Eigenschaften der dargestellten Metallchelate des Monothiodibenzoylmethans. * L = C₆H₅—CS—CH—CO—C₆H₅; Py = Pyridin. ** Schmp. auf dem Mikroheiztisch nach Boetius bestimmt, (Z) Zersetzungsbeginn.

⁴ B. N. FIGGIS and J. LEWIS, Progress in Inorganic Chemistry Vol. 6, p. 174, J. Wiley, London 1964.

⁵ R. V. PARISH, Coordinat. Chem. Rev. 1, 445 [1966].

⁶ H. L. SCHLÄFER u. G. GLIEMANN, Einführung in die Ligandenfeldtheorie, Akademische Verlagsgesellschaft, Geest & Portig, Leipzig 1967, S. 144.

zusätzliche Koordination von Wassermolekülen vorhanden⁷.

Eisen(II)- und Mangan(II)-Verbindung des Monothiodibenzoylmethans konnten nur in Form ihrer Dipyridinaddukte dargestellt werden. Beide Chelate sind an der Luft stabil und in polaren und unpolaren Lösungsmitteln gut löslich.

Experimenteller Teil

Tetrakis(monothiodibenzoylmethanato)-ruthenium(IV) und -osmium(IV)

0,001 Mol $\text{Na}_2[\text{RuCl}_6]$ (0,336 g) bzw. $\text{K}_2[\text{OsCl}_6]$ (0,48 g) werden in 30 ml Wasser gelöst und zu einer Lösung von 0,004 Mol Komplexbildner (0,96 g) in 100 ml Alkohol bei 20° unter Rühren zugetropft. Die Ausbeute der bald kristallisierenden Tetrakis-Chelate beträgt 0,6 bzw. 0,4 g.

Tris(monothiodibenzoylmethanato)-ruthenium(III) und -osmium(III)

Die Reaktionsansätze entsprechen der obigen Vorschrift, jedoch wurde bei der Umsetzung mit 1 g Natriumacetat gepuffert und die Fällung aus siedender alkoholischer Lösung vorgenommen. Die Ausbeuten der Metallchelate betrugen 0,3 g (Ru) bzw. 0,85 g (Os).

Bis(monothiodibenzoylmethanato)-kobalt(II)

2,4 g (0,01 Mol) Monothiodibenzoylmethan und 15 ml Piperidin werden in 150 ml Äthanol gelöst und dazu unter Rühren 1,4 g (0,005 Mol) $\text{Co}(\text{ac})_2 \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$ in 30 ml Wasser zugegeben. Die Kobaltlösung wurde vorher mit einem Tropfen konz. Schwefelsäure angesäuert. Während der Reaktion läßt man die Temperatur nicht über 20° C ansteigen. Das ausfallende braune Kristallpulver wird mit Wasser und 50-proz. Alkohol gewaschen und an der Luft getrocknet. Ausbeute 2,2 g.

Bis(monothiodibenzoylmethanato)-aquo-oxovanadium(IV)

1,45 g (0,0057 Mol) des Liganden werden in 250 ml Methanol gelöst, mit 1 g Natriumacetat gepuffert und dann in der Kälte ($t < 20^\circ \text{C}$) eine Lösung von 0,6 g

(0,0028 Mol) $\text{VOSO}_4 \cdot 3 \text{H}_2\text{O}$ in 40 ml Wasser unter Rühren zugegeben. Das ausgefallene grüne Rohprodukt löst man in kaltem Chloroform und fällt mit Petroläther wieder aus. Ausbeute 1,2 g.

Tris(monothiodibenzoylmethanato)-eisen(III)

1,35 g (0,005 Mol) $\text{FeCl}_3 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$ werden in 50 ml Wasser gelöst und unter Rühren und Pufferung mit Natriumacetat bei 18° C der Lösung von 3,6 g (0,015 Mol) des Komplexbildners in 300 ml Äthanol zugesetzt. Das ausgefallene schwarze Rohprodukt löst man in 50 ml Chloroform auf und bringt die Substanz mit Zusatz des vierfachen Volumens an Petroläther über Trockeneis zur Kristallisation. Ausbeute 2,4 g, schöne schwarze Kristalle.

Bis(monothiodibenzoylmethanato)-bis(pyridin)-eisen(II)

1,96 g (0,005 Mol) Mohrsches Salz werden in 30 ml sauerstofffreiem Wasser, das mit 3 Tropfen konz. Schwefelsäure angesäuert war, aufgelöst und bei guter Kühlung (15° C) unter Rühren zu einer Lösung von 2,4 g (0,01 Mol) Monothiodibenzoylmethan in 100 ml Pyridin gegeben. Den entstandenen grünen Niederschlag löst man in kaltem Pyridin, filtriert und versetzt wieder unter Kühlung (15° C) mit Wasser, bis der Kristallisationsprozeß einsetzt. Das schwarzgrüne Kristallpulver wird im Exsikkator über Calciumchlorid getrocknet. Ausbeute 1,9 g.

Die Darstellung der Manganverbindung erfolgt in analoger Weise. Ausbeute 2,3 g.

Analysenmethoden

Zur Bestimmung von Osmium und Ruthenium wurden die Komplexe in ein Quarzschiffchen eingewogen, mit feingepulverter Oxalsäure überschichtet und in einer Quarzapparatur im Wasserstoffstrom unter allmählicher Aufheizung auf 700° C zum Metall reduziert.

Die magnetischen Momente wurden auf einer Magnetwaage nach Gouy bestimmt. Zur Aufnahme der IR-Spektren diente das UR 10 des VEB Carl Zeiss Jena.

Herrn Prof. Dr. H. HOLZAPFEL danken wir für die Möglichkeit zur Durchführung dieser Untersuchungen, Herrn Prof. Dr. M. MÜHLSTÄDT für die Bereitstellung von Edelmetallen. Herrn Dipl.-Chem. R. MARTIN gilt unser Dank für die bewährte Erledigung der Mikroanalysen und Herrn Dr. W. WINDSCH für die Aufnahme der ESR-Spektren.

⁷ R. P. DODGE, D. H. TEMPLETON u. A. ZALKIN, J. chem. Physics 35, 55 [1961].