Experimentelles

Zur Darstellung der Dicholesterinester der Dicarbonsäuren wurden 0,02 Mol Cholesterin, 0,011 Mol Dicarbonsäure und 0,5 g *p*-Toluolsulfonsäure mit 100 ml Dioxan 16 Std. am Rückfluß erhitzt. Anschließend wurde die Lösung abgekühlt, in 500 ml Wasser eingegossen, wobei die Diester neben Cholesterin und Nebenprodukten anfielen. Das Gemisch wurde abgesaugt, mehrfach mit Wasser gewaschen und getrocknet. Durch Kochen mit Äthanol wurden die als Verunreinigungen vorliegenden Feststoffe in Lösung gebracht, während die Diester ungelöst zurückblieben. Dieser Vorgang wurde zweimal wiederholt. Anschließend wurden die Diester in Methylchlorid gelöst und mit der 5-fachen Menge an Äthanol versetzt. Beim Verkochen des Methylchlorids fielen die Diester allmählich aus. Durch mehrfaches Umkristallisieren in Dichlormethan/Äthanol oder in *n*-Propanol wurden die reinen Endprodukte erhalten, die infrarotspektrometrisch auf die Abwesenheit von Hydroxylbanden und durch Elementaranalysen geprüft wurden.

Ausbeute: 15 bis 20% der Theorie.

¹ S. P. BROWN, Materials Evaluation **26**, 163 [1968].

² B. BÖTTCHER, D. GROSS u. E. MUNDY, Z. Materialprüfung **11**, 156 [1969].

³ D. GROSS u. B. BÖTTCHER, Z. Naturforsch. **25b**, 1099 [1970].

Die Bestimmung der Schmelz- und Klärpunkte erfolgte mit einem handelsüblichen Gerät zur Schmelzpunktbestimmung (Fa. Mettler, Modell FP 2), bestehend aus einem digital anzeigenden Temperatursteuergerät, einem mit Polarisationsfiltern ausgerüsteten Mikroheiztisch und einem Stereomikroskop. Die lineare Aufheizrate betrug 2 °C/min. Die erhaltenen Ergebnisse sind in der nachstehenden Tab. 1 zusammengefaßt.

Dicholesterinester der	Schmelzpunkt in °C	Klärpunkt in °C
Oxalsäure	184 ^b , 227 ^c	253
Bernsteinsäure	217	208
Adipinsäure	199	185
Korksäure	183	164
Sebazinsäure	176	151
Phthalsäure	179	—

Tab. 1. Schmelz- und Klärpunkte von Dicholesterinestern ^a, ^a aus CH₂Cl₂/C₂H₅OH, ^b Erweichungspunkt, ^c l. c. ⁴ 227 °C.

⁴ F. RADT (Hrsg.), Elsevier's Encyclopaedia of organic Chemistry, Series III, Vol. 14, Suppl., p. 16215, Amsterdam 1954.

Zur Gewinnung von Porphobilinogen aus δ-Aminolävulinsäure mittels *P. shermanii*: Bemerkenswerter Effekt einer Hitzebehandlung der Zellen

Preparation of Porphobilinogen from δ-aminolevulinic Acid by Means of *P. shermanii*: Remarkable Effect by Heat Treatment

GERHARD MÜLLER

Isotopenlaboratorium des Fachbereichs Chemie
der Universität Stuttgart

(Z. Naturforsch. **27b**, 473—474 [1972]; eingegangen am 19. Januar 1972)

Unsere Versuche zur Darstellung von Porphobilinogen aus δ-Aminolävulinsäure mittels Zellsuspensionen von *P. shermanii* hatten gezeigt, daß Inkubationen bei relativ hoher Temperatur (70 °C) zu den besten Ausbeuten führen¹. Diese ungewöhnlichen Bedingungen veranlaßten uns, hierzu weitere Untersuchungen durchzuführen. Sie ergaben bisher, daß Zellen von *P. shermanii*, die in wäßrigem Medium einer Hitzebehandlung unterworfen worden waren, zur Umwandlung von δ-Aminolävulinsäure in Porphobilinogen wesentlich geeigneter sind als unbehandelte Zellen. Bei 30 °C ist

mit hitzebehandelten Zellen eine ca. sechsfach höhere Porphobilinogen-Bildung zu verzeichnen. Unter diesen Bedingungen wird die Bildung von Kondensationsprodukten des Porphobilinogen weitgehend vermieden. Gegenüber dem früheren Verfahren ergibt sich hieraus eine erhebliche Vereinfachung der Reinigungsoperationen und eine Ausbeutesteigerung von 21 auf 54 Prozent.

Die bisherigen Untersuchungen zur Aufklärung der Ursachen dieses Effektes haben ergeben, daß die Steigerung der Ausbeute an Porphobilinogen nicht nur mit einer teilweisen Inaktivierung der Porphyrin-Bildung erklärt werden kann. Weitere Versuche sollen zeigen, ob δ-Aminolävulinsäure-Aufnahme bzw. Porphobilinogen-Abgabe durch Veränderungen der Zellmembran bzw. der Transportmechanismen begünstigt werden. Ferner werden wir untersuchen, ob in *P. shermanii* der Succinat-Glycin-Zyklus verwirklicht ist (s. dazu l. c.²). Weitere Versuche sollen auch darüber Aufschluß geben, ob die Hitzebehandlung eine Aktivierung sowie einen konservierenden und stabilisierenden Einfluß auf die δ-Aminolävulinsäure-Dehydratase ausübt. Es zeigte sich nämlich, daß mit den vorbehandelten Zellen mindestens 20 Inkubationen mit unveränderter Porphobilinogen-Ausbeute durchgeführt werden können. Zur Darstellung von Porphobilinogen eignen sich neben frisch isolierten sowohl gefriergetrocknete als auch tiefgefrorene Zellen. In gefrorenem bzw. lyophilisiertem Zustand behalten sie ihre Aktivität über einige Jahre.

Sonderdruckanforderungen an Dr. GERHARD MÜLLER,
D-700 Stuttgart, Azenbergstraße 14—16.

Beschreibung der Versuche

δ -Aminolävulinsäure wird nach NEUBERGER und SCOTT³ dargestellt. Die Fermentationen werden, wie bereits früher beschrieben^{1,4}, unter Verwendung von Cornsteep oder eines synthetischen Nährmediums durchgeführt.

Gewinnung von Porphobilinogen. 80 g gefriergetrocknete Zellen (entsprechend 270 g Bakterienfeuchtmasse) werden in 2 l Tris/HCl-Puffer (pH 8,2, 0,05 M an Tris) suspendiert und während 30 Min. bei 70 °C unter Rühren vorinkubiert. Anschließend wird abzentrifugiert und die Zellmasse erneut in der gleichen Menge Tris/HCl-Puffer gleicher Zusammensetzung suspendiert. Diese Suspension wird mit einer Lösung von 1,6 g δ -Aminolävulinsäure-hydrochlorid in 100 ml H₂O, deren pH mit Tris-Lösung auf 8,2 eingestellt wurde, versetzt und in einem 4-l-Rundkolben, der mit einem Wattestopfen verschlossen wird, unter Rühren (Magnet-rührer) 20 Stunden bei 30 °C inkubiert. Dann wird von der Zellmasse abzentrifugiert und der pH der Lösung mit verdünnter HCl auf 7,2 eingestellt. Anschließend wird die Lösung auf eine kurze Säule (5 cm Länge, 4,5 cm Durchmesser) aus DEAE-Cellulose (Fa. Merck, Darmstadt) gegeben, deren Chlorid-Form mit Tris-HCl-Puffer (pH 7,2, 0,05 M an Tris) so lange gewaschen worden war, bis der Durchlauf ein pH von 7,2 hatte. Es wird so lange mit diesem Puffer eluiert, bis kein Porphobilinogen mehr von der Säule kommt. Der pH

des Eluats wird mit verdünnter HCl auf 4 eingestellt und das Porphobilinogen mit 20-proz. Quecksilber(II)-acetat-Lösung gefällt. Der Niederschlag wird abzentrifugiert, mit H₂S zersetzt und vom HgS abzentrifugiert⁵. Dieses wird mehrere Male mit wenig Wasser extrahiert. Danach wird der pH der Lösung mit konz. Ammoniak auf 4 gestellt, wobei sich das Porphobilinogen abscheidet. Nach mehreren Std. im Kühlschrank werden die Kristalle abgesaugt, mit eiskalter verdünnter Essigsäure (pH 4) und anschließend mit wenig kaltem Aceton gewaschen. Das so gewonnene Produkt ist in den meisten Fällen genügend rein.

Falls eine Umkristallisation notwendig ist, wird das Rohprodukt in möglichst wenig 0,5 N Ammoniak gelöst, eventuell filtriert, und bis zur Aufhellung etwas DEAE-Cellulose (OH⁻-Form) eingerührt. Nachdem vom Austauscher abfiltriert worden war, stellt man zur Fällung des Porphobilinogen den pH mit Eisessig vorsichtig auf 4 ein, läßt mehrere Std. im Kühlschrank stehen, saugt ab und trocknet im Exsiccator über KOH. Ausbeute: 635 mg (54% der Theorie).

Das Verfahren konnte ohne Schwierigkeiten auch mit größeren Mengen, z. B. in 8-l-Ansätzen, durchgeführt werden.

Der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Verband der Chemischen Industrie bin ich für Personal- und Sachbeihilfen zu Dank verpflichtet.

¹ G. MÜLLER u. G. BEZOLD, Z. Naturforsch. **24b**, 47 [1969].

² Literaturzusammenstellung: G. S. MARKS: Heme and Chlorophyll, S. 129–130, Van Norstrand Company Ltd., London 1969.

³ A. NEUBERGER and J. J. SCOTT, J. chem. Soc. [London] **1954**, 1820.

⁴ G. MÜLLER, W. DIETERLE u. G. SIEBKE, Z. Naturforsch. **25b**, 307 [1970].

⁵ G. H. COOKSON and C. RIMINGTON, Biochem. J. **57**, 476 [1954].

A New Synthesis of Furo(2,3-b)quinoline

P. SHANMUGAM and P. LAKSHMINARAYANA

Department of Organic Chemistry, University of Madras, Madras 25, India

(Z. Naturforsch. **27b**, 474–476 [1972]; received November 16, 1971, revised December 24, 1971)

Furo(2,3-b)-quinoline (**5**) is the parent compound of many alkaloids¹ of the Rutaceae. Of the two methods^{2,3} known for its synthesis, the one due to KING et al., involved in the final step, the catalytic dehydrogenation of the dihydrobase **8** with Pd/c. The base **8** is now obtainable^{4–6}, through a shorter reaction sequence than the one employed by them². But the dehydrogenation of **8** to **5** could not be effected inspite of repeated trials using varying strengths of the catalyst. The only published synthesis of **5** is that

of GRUNDON and MCCORKINDALE who obtained it from a synthetic precursor to dictamnine. Apart from a number of steps involved, the yield at most of the stages leading to the precursor as well as its conversion to **5** is not appreciable. Hence a need to accomplish a neat and convenient synthesis of the title compound was felt by us and this communication deals with such an objective realised through the use of 4-carboxy-3-vinyl-2-quinoline (**1**)⁷.

Requests for reprints should be sent to Dr. P. SHANMUGAM, Reader in Organic Chemist University of Madras, A. C. College Campus, Madras 25 (India).