Vergleich zwischen ^{11}B - und ^{13}C -chemischen Verschiebungen dreifach koordinierter Borverbindungen und Carbenium-Ionen

Comparison between ^{11}B and ^{13}C Chemical Shifts of Three-Coordinate Boron Compounds and Carbenium Ions

Bernd Wrackmeyer*

Institut für Anorganische Chemie der Universität München, Meiserstraße 1, D-8000 München 2

Z. Naturforsch. **35b**, 439–446 (1980); eingegangen am 5. November/14. Dezember 1979

Boranes, Carbenium Ions, ^{13}C NMR Spectra, ^{11}B NMR Spectra

The relationship between ^{11}B chemical shifts ($\delta^{11}\text{B}$) of trigonal boranes and $^{13}\text{C}^\oplus$ chemical shifts ($\delta^{13}\text{C}^\oplus$) of carbenium ions was found to be more complex than previously reported. The trends observed allow for the comparison of (pp) π bonding between boron and suitable substituents with the π -charge delocalization in carbenium ions. In case of the ferrocenyl boranes and ferrocenyl carbenium ions the markedly different trend in the shielding of ^{11}B and $^{13}\text{C}^\oplus$ favours a fulvene-like structure for the substituted cyclopentadienyl ring in the latter. Structural features are analogously reflected by $\delta^{11}\text{B}$ and $\delta^{13}\text{C}^\oplus$ data for both series of compounds. Comparison of $\delta^{13}\text{C}$ data of organoboranes and carbenium ions can be useful in conformational studies.

Einführung

Wesentliche Fortschritte in der Chemie des Bors in Boranen, Organoboranen, Polyboranen und Heteropolyboranen [1] sind der ^{11}B -NMR-Spektroskopie zu verdanken. Gleiches gilt für die ^{13}C -NMR-Spektroskopie im Hinblick auf die Struktur und das dynamische Verhalten von Carbokationen [2]. Da Borane und Carbokationen isoelektronisch und in vielen Fällen isostrukturell sind, ist der Vergleich von NMR-Parametern beider Verbindungsklassen besonders reizvoll. Eine große Zahl von $\delta^{11}\text{B}$ -Werten für Verbindungen des dreiwertigen Bors steht zur Verfügung [3] und insbesondere Olah *et al.* gelang es, eine Vielzahl von $\delta^{13}\text{C}^\oplus$ -Werten von analogen Carbokationen zu ermitteln [4].

Bisher wurden Beziehungen gefunden zwischen $\delta^{11}\text{B}$ -Werten von Boraten und $\delta^{13}\text{C}$ -Werten analog substituierter Kohlenwasserstoffe [5, 6], für $\delta^{11}\text{B}$ und $\delta^{13}\text{C}$ isoelektronischer Polyborane und Carborane [7] und für $\delta^{13}\text{C}$ nichtklassischer Carbokationen und $\delta^{11}\text{B}$ der entsprechenden Polyborane oder Carborane [8, 9]. Eine lineare Beziehung zwischen $\delta^{11}\text{B}$ trigonaler Borverbindungen und $\delta^{13}\text{C}$ vergleichbarer Carbeniumionen wurde unabhängig von zwei Arbeitsgruppen ermittelt [10, 11]. Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, die letztere Beziehung kritisch zu untersuchen unter Berücksichtigung

zahlreicher $\delta^{11}\text{B}$ - und $\delta^{13}\text{C}^\oplus$ -Daten, die in jüngster Zeit zugänglich wurden. Es wurde berichtet [10, 11], daß die Daten für einige Verbindungspaare signifikant von der linearen Beziehung $\delta^{11}\text{B}/\delta^{13}\text{C}^\oplus$ abweichen, ohne daß eine befriedigende Erklärung hierfür gegeben werden konnte. Die Einbeziehung zusätzlicher Daten ermöglicht nun eine mehr konsistente Interpretation.

Ergebnisse und Diskussion

Chemische Verschiebungen ($\delta^{11}\text{B}$, $\delta^{13}\text{C}^\oplus$) sind in Tab. I zusammengestellt. Abb. 1 enthält die graphische Darstellung der Beziehung $\delta^{11}\text{B}/\delta^{13}\text{C}^\oplus$.

Borane $R_{3-n}\text{BX}_n$

($n = 1-3$; $R = \text{Alkyl}, \text{H}$; $X = \text{F}, \text{Cl}, \text{Br}, \text{OR}$)

Die Einträge **1-4**, **26**, **30**, **33**, **35**, **36**, **42**, **43**, **46** in Tab. I entsprechen der ursprünglich berichteten Beziehung [10, 11] (Gl. (1)) (durchgezogene Linie):

$$\delta^{11}\text{B}[\text{BF}_3 \cdot \text{O}(\text{C}_2\text{H}_5)_2] = 0,384 \delta^{13}\text{C}^\oplus [(\text{CH}_3)_4\text{Si}] - 42,8 \quad (1)$$

Wie ersichtlich, unterstützen einige neuere Daten diesen Befund, jedoch zeigt Abb. 1 deutlich, daß zahlreiche Wertepaare verstreut sind und mehr oder weniger weit entfernt von dieser Kurve liegen. Das Ausmaß dieser Abweichungen ist nicht mit Lösungsmiteleinflüssen auf $\delta^{11}\text{B}$ oder $\delta^{13}\text{C}$ zu erklären, sondern muß seine Ursache in unterschiedlicher elektronischer und/oder struktureller Konstitution der Verbindungen haben.

* Sonderdruckanforderungen an Dr. Bernd Wrackmeyer.

Tabelle I. $\delta^{11}\text{B}$ -Werte für trigonale Borane und $\delta^{13}\text{C}$ -Werte für Carbeniumionen.

Nr.	Verbindung	$\delta^{11}\text{B}^{\text{a}}$	$\delta^{13}\text{C}^{\text{b}}$	Verbindung	Nr.
1 a	$(\text{CH}_3)_3\text{B}$	86,0	335,2 ^c	$(\text{CH}_3)_3\text{C}^{\oplus}$	1 b
2 a	$(\text{CH}_3)_2\text{BC}_2\text{H}_5$	86,1 ^d	335,4 ^c	$(\text{CH}_3)_2\text{CC}_2\text{H}_5$	2 b
3 a	$\text{CH}_3\text{B}(\text{C}_2\text{H}_5)_2$	86,2 ^d	336,4 ^c	$\text{CH}_3\text{C}^{\oplus}(\text{C}_2\text{H}_5)_2$	3 b
4 a	$(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{B}$	86,5	336,8 ^c	$(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{C}^{\oplus}$	4 b
5 a		86,0 ^e	329,6 ^f		5 b
6 a		89,4 ^e	325,7 ^f		6 b
7 a		93,0 ^e	340,2 ^g		7 b
8 a	$[(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{C}(\text{CH}_3)_2]_2\text{BH}$	81,0	320,6 ^c	$(\text{CH}_3)_2\text{C}^{\oplus}\text{H}$	8 b
9 a		82,6	299,8 ^h		9 b
10 a		85,0 ⁱ	322,7 ^j		10 b
11 a	$(\text{CH}_3)_2\text{B}-\triangleleft$	81,8	281,4 ^k	$(\text{CH}_3)_2\text{C}^{\oplus}-\triangleleft$	11 b
12 a	$(\text{CH}_3)_2\text{B}-\text{CH}=\text{CH}_2$	74,5	274,3 ^l	$(\text{CH}_3)_2\text{C}^{\oplus}-\text{CH}=\text{CH}_2$	12 b
13 a	$(\text{CH}_3)_2\text{B}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_3$	71,7	269,0 ^m	$(\text{CH}_3)_2\text{C}^{\oplus}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_3$	13 b
14 a	$(\text{CH}_3)_2\text{B}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}_6\text{H}_5$	71,0 ^e	237,1 ^m	$(\text{CH}_3)_2\text{C}^{\oplus}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}_6\text{H}_5$	14 b
15 a		52,8	209,7 ^c		15 b
16 a	$(\text{CH}_3)_2\text{B}-\text{C}_6\text{H}_5$	77,6	254,3 ^o	$(\text{CH}_3)_2\text{C}^{\oplus}-\text{C}_6\text{H}_5$	16 b
17 a		77,6	259,5 ^j		17 b
18 a		84,5	278,0 ^o		18 b
19 a		82,6 ^q	251,8 ^r		19 b
20 a	$\text{CH}_3\text{B}(\text{C}_6\text{H}_5)_2$	70,6	229,9 ^o	$\text{CH}_3\text{C}^{\oplus}(\text{C}_6\text{H}_5)_2$	20 b
21 a		60,0	200,5 ^s		21 b
22 a	$(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{B}$	68,0 ^q	212,7 ^o	$(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{C}^{\oplus}$	22 b
23 a		58,0	205,1 ^t		23 b

Tab. I (Fortsetzung)

Nr.	Verbindung	$\delta^{11}\text{B}^{\text{a}}$	$\delta^{13}\text{C}^{\text{b}}$	Verbindung	Nr.
24 a	$\text{C}_5\text{H}_5\text{FeC}_5\text{H}_4\text{B}(\text{CH}_3)_2$	71,6	158,6 ^u	$\text{C}_5\text{H}_5\text{FeC}_5\text{H}_4\text{C}^{\oplus}(\text{CH}_3)_2$	24 b
25 a	$[(\text{CH}_3)_2\text{BC}_5\text{H}_4]_2\text{Fe}$	72,7	217,8 ^v	$[(\text{CH}_3)_2\overset{\oplus}{\text{C}}\text{C}_5\text{H}_4]_2\text{Fe}$	25 b
26 a	$(\text{CH}_3)_2\text{B}-\text{F}$	60,1	282,8 ^w	$(\text{CH}_3)_2\text{C}^{\oplus}-\text{F}$	26 b
27 a	$(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{B}-\text{F}$	59,6	285,0 ^w	$(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{C}^{\oplus}-\text{F}$	27 b
28 a		40,0	187,0 ^x		28 b
29 a	$\text{C}_6\text{H}_5\text{BF}_2$	25,5	178,5 ^x	$\text{C}_6\text{H}_5\overset{\oplus}{\text{C}}\text{F}_2$	29 b
30 a	$(\text{CH}_3)_2\text{B}-\text{Cl}$	77,2	314,6 ^w	$(\text{CH}_3)_2\text{C}^{\oplus}-\text{Cl}$	30 b
31 a		76,5	318,6 ^w		31 b
32 b		83,5 ^e	316,3 ^w		32 b
33 a	$(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{B}-\text{Cl}$	61,0	269,5 ^y	$(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{C}^{\oplus}-\text{Cl}$	33 b
34 a	$\text{C}_6\text{H}_5\text{BCl}_2$	55,0	212,1 ^z	$\text{C}_6\text{H}_5\overset{\oplus}{\text{C}}\text{Cl}_2$	34 b
35 a	$(\text{CH}_3)_2\text{BBr}$	78,8	320,6 ^{aa}	$(\text{CH}_3)_2\overset{\oplus}{\text{C}}\text{Br}$	35 b
36 a	$(\text{CH}_3)_2\text{B}-\text{OH}$	53,0	250,3 ^k	$(\text{CH}_3)_2\text{C}^{\oplus}-\text{OH}$	36 b
37 a		53,0 ^e	251,1 ^g		37 b
38 a		58,5 ^e	259,5 ^g		38 b
39 a		52,9 ⁱ	267,1 ^j		39 b
40 a	$\text{CH}_3\text{O}-\text{B}(\text{C}_6\text{H}_5)_2-\text{OCH}_3$	38,0 ^{bb}	191,9 ^{ce}		40 b
41 a	$(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{B}-\text{OH}$	45,0 ^e	209,1 ^o	$(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{C}^{\oplus}-\text{OH}$	41 b
42 a	$\text{CH}_3-\text{B}(\text{OH})_2$	31,9	193,0 ^k	$\text{CH}_3-\text{C}^{\oplus}(\text{OH})_2$	42 b
43 a	$\text{C}_6\text{H}_5-\text{B}(\text{OH})_2$	28,4	181,9 ^z	$\text{C}_6\text{H}_5-\text{C}^{\oplus}(\text{OH})_2$	43 b
44 a	$\text{H}-\text{B}(\text{OCH}_3)_2$	26,1	176,0 ^k	$\text{H}-\text{C}^{\oplus}(\text{OH})_2$	44 b
45 a		29,0 ^e	170,4 ^{dd}		45 b
46 a	$\text{B}(\text{OH})_3$	18,8	166,3 ^k	$\text{C}^{\oplus}(\text{OH})_3$	46 b
47 a	$\text{CH}_3\text{S}-\text{B}(\text{C}_6\text{H}_5)_2$	59,2 ^{ee}	190,4 ^{e,ff}	$\text{CH}_3\text{S}-\overset{\oplus}{\text{C}}(\text{C}_6\text{H}_5)_2$	47 b
48 a		53,0 ^{gg}	184,9 ^{dd}		48 b
49 a	$(\text{CH}_3)_2\text{B}-\text{N}(\text{CH}_3)_2$	44,6	189,5 ^{hh}	$(\text{CH}_3)_2\text{C}^{\oplus}-\text{N}(\text{CH}_3)_2$	49 b
50 a	$(\text{CH}_3)_2\text{B}-\text{NHCH}_3$	45,7	195,5 ^{hh}	$(\text{CH}_3)_2\text{C}^{\oplus}-\text{NHCH}_3$	50 b

Tab. I (Fortsetzung)

Nr.	Verbindung	$\delta^{11}\text{B}^{\text{a}}$	$\delta^{13}\text{C}^{\text{b}}$	Verbindung	Nr.
51 a	$\text{H}_2\text{B}-\text{N}(\text{CH}_3)_2$	37,9	167,6– 170,0 ^{hh,ii}	$\text{H}_2\text{C}^{\oplus}-\text{N}(\text{CH}_3)_2$	51 b
52 a	$\text{HB}[\text{N}(\text{CH}_3)_2]_2$	28,6	157,7 ^{jj}	$\text{HC}^{\oplus}[\text{N}(\text{CH}_3)_2]_2$	52 b
53 a	$\text{B}(\text{NR}_2)_3$	22–30	ca. 160 ^{kk}	$\text{C}^{\oplus}(\text{NR}_2)_3$	53 b
54 a	$\text{Cl}_2\text{B}-\text{N}(\text{CH}_3)_2$	30,8	160,5 ⁱⁱ	$\text{Cl}_2\text{C}^{\oplus}-\text{N}(\text{CH}_3)_2$	54 b
55 a	$\text{Cl}-\text{B}[\text{N}(\text{CH}_3)_2]_2$	27,9	160,0 ^{ll}	$\text{Cl C}^{\oplus}[\text{N}(\text{CH}_3)_2]_2$	55 b
56 a	$\text{Cl}-\text{B}[\text{N}(\text{CH}_3)\text{CH}_2]_2$	26,7	157,4 ^{al}	$\text{Cl}-\text{C}^{\oplus}[\text{N}(\text{CH}_3)\text{CH}_2]_2$	56 b
57 a	$\text{CH}_3-\text{B} \begin{array}{l} \diagup \text{N}(\text{CH}_3)_2 \\ \diagdown \text{OCH}_3 \end{array}$	31,8	176,3 ⁱⁱ	$\text{CH}_3\text{C}^{\oplus} \begin{array}{l} \diagup \text{N}(\text{CH}_3)_2 \\ \diagdown \text{OCH}_3 \end{array}$	57 b
58 a	$\text{H}-\text{B} \begin{array}{l} \diagup \text{N}(\text{CH}_3)_2 \\ \diagdown \text{OCH}_3 \end{array}$	29,0	168,9 ⁱⁱ	$\text{H}-\text{C}^{\oplus} \begin{array}{l} \diagup \text{N}(\text{CH}_3)_2 \\ \diagdown \text{OCH}_3 \end{array}$	58 b
59 a	$\text{CH}_3\text{O}-\text{B}[\text{N}(\text{CH}_3)_2]_2$	25,1	164,3 ⁱⁱ	$\text{CH}_3\text{O}-\text{C}^{\oplus}[\text{N}(\text{CH}_3)_2]_2$	59 b
60 a	$\text{C}_6\text{H}_5\text{O}-\text{B}[\text{N}(\text{CH}_3)\text{CH}_2]_2$	24,7	158,9 ^{kk}	$\text{C}_6\text{H}_5\text{O}-\text{C}^{\oplus}[\text{N}(\text{CH}_3)\text{CH}_2]_2$	60 b
61 a	$(\text{C}_6\text{H}_5\text{O})_2\text{B}-\text{N}(\text{CH}_3)_2$	21,3	157,8 ⁱⁱ	$(\text{C}_6\text{H}_5\text{O})_2\text{C}^{\oplus}-\text{N}(\text{CH}_3)_2$	61 b
62 a	$\text{CH}_3-\text{B} \begin{array}{l} \diagup \text{N}(\text{CH}_3)_2 \\ \diagdown \text{SCH}_3 \end{array}$	43,6	191,6 ⁱⁱ	$\text{CH}_3-\text{C}^{\oplus} \begin{array}{l} \diagup \text{N}(\text{CH}_3)_2 \\ \diagdown \text{SCH}_3 \end{array}$	62 b
63 a	$\text{CH}_3\text{S}-\text{B}[\text{N}(\text{CH}_3)_2]_2$	34,6	176,7 ^{kk}	$\text{CH}_3\text{S}-\text{C}^{\oplus}[\text{N}(\text{CH}_3)_2]_2$	63 b
64 a	$(\text{CH}_3\text{S})_2\text{B}-\text{N}(\text{CH}_3)_2$	43,4	193,7 ⁱⁱ	$(\text{CH}_3\text{S})_2\text{C}^{\oplus}-\text{N}(\text{CH}_3)_2$	64 b

^a In ppm zu tiefem Feld von $\text{BF}_3 \cdot \text{O}(\text{C}_2\text{H}_5)_2$; Daten aus Lit. [3] wenn nicht anders angezeigt; ^b in ppm zu tiefem Feld von $(\text{CH}_3)_4\text{Si}$; ^c G. A. Olah und D. J. Donovan, *J. Am. Chem. Soc.* **99**, 5026 (1977); ^d E. J. Stampf und J. D. Odom, *J. Organomet. Chem.* **131**, 171 (1977); ^e diese Arbeit; ^f Lit. [19]; ^g R. P. Kirchen und T. S. Sorenson, *J. Am. Chem. Soc.* **99**, 6687 (1977); ^h G. A. Olah und G. Liang, *J. Am. Chem. Soc.* **95**, 194 (1973); ⁱ B. M. Mikhailov, T. A. Shchegoleva, E. M. Shashkova und V. G. Kiselev, *Izvest. Akad. Nauk. SSSR, Ser. Khim.* **1977**, 894; ^j G. A. Olah, G. Liang und G. P. Matiescu, *J. Org. Chem.* **39**, 3750 (1974); ^k Lit. [2]; ^l Lit. [18]; ^m G. A. Olah, R. J. Spear, P. W. Westerman und J.-M. Denis, *J. Am. Chem. Soc.* **96**, 5855 (1974); ⁿ G. A. Olah, R. J. Spear, G. Messina und P. W. Westerman, *J. Am. Chem. Soc.* **97**, 4051 (1975); ^o G. A. Olah, P. W. Westerman und J. Nishimura, *J. Am. Chem. Soc.* **96**, 3548 (1974); ^p Lit. [20]; ^q Lit. [13]; ^r G. A. Olah, G. Asensio und H. Mayr, *J. Org. Chem.* **43**, 1518 (1978); ^s G. A. Olah, J. S. Staral, G. Asensio, G. Liang, D. A. Forsyth und G. D. Mateescu, *J. Am. Chem. Soc.* **100**, 6299 (1978); ^t G. A. Olah und R. J. Spear, *J. Am. Chem. Soc.* **97**, 1539 (1975); ^u Lit. [22a]; ^v Lit. [23]; ^w G. A. Olah, G. Liang und Y. K. Mo, *J. Org. Chem.* **39**, 2394 (1974); ^x R. J. Spear, D. A. Forsyth und G. A. Olah, *J. Am. Chem. Soc.* **98**, 2493 (1976); ^y Lit. [11]; ^z G. A. Olah, P. W. Westerman und D. A. Forsyth, *J. Am. Chem. Soc.* **97**, 3419 (1975); ^{aa} G. A. Olah, Y. K. Mo und Y. Halpern, *J. Am. Chem. Soc.* **94**, 3551 (1972); ^{bb} G. E. Herberich und B. Hessner, *J. Organomet. Chem.* **161**, C 36 (1978); ^{cc} G. A. Olah und D. J. Donovan, *J. Org. Chem.* **43**, 1743 (1978); ^{dd} G. A. Olah und J. L. Grant, *J. Org. Chem.* **42**, 2237 (1977); ^{ee} R. Goetze und H. Nöth, in Vorbereitung; ^{ff} da die ursprünglich berichteten Daten (siehe Fußnote dd) nicht korrekt erschienen, wurde das System neu untersucht:

^{gg} Extrapolierter Wert ($\delta^{11}\text{B}$ des $\text{B}-\text{CH}_3$ -Derivats ist 62,0 ppm [3]); ^{hh} G. A. Olah und D. J. Donovan, *J. Org. Chem.* **43**, 860 (1978); ⁱⁱ C. Rabiller, J. P. Renou und G. J. Martin, *J. Chem. Soc. Perkin II* **1977**, 536; ^{jj} J. Schmetzler, J. Daub und P. Fischer, *Angew. Chem.* **87**, 489 (1975); *Int. Ed. Engl.* **14**, 487 (1975); ^{kk} H. O. Kalinowski und H. Kessler, *Org. Magn. Reson.* **7**, 128 (1975); ^{ll} H. O. Kalinowski und H. Kessler, *Org. Magn. Reson.* **6**, 305 (1974).

Abb. 1. Korrelation von $\delta^{11}\text{B}$ - und $\delta^{13}\text{C}$ -Werten. Nummern entsprechen den Einträgen in Tab. I.

- ⊕ Für Berechnung von Gl. (1);
- Trialkylborane, Alkoxy-, Fluor- und Chlor-Derivate;
- Phenyl-, Alkenyl-, Alkynyl- und Cyclopropyl-Derivate;
- △ Ferrocenyl-Derivate;
- × Amino-Derivate;
- ⊗ Ditholium-Derivate.

Obwohl keine strikte theoretische Grundlage besteht, zeigen Berechnungen, daß die Abschirmung von ^{11}B - und ^{13}C -Kernen in trigonalen Boranen und Carbeniumionen wesentlich von den π -Elektronendichten $q_{\text{B}\pi}$ [12] und $q_{\text{C}\pi}$ [13] bestimmt wird. Unter der Voraussetzung, daß Substituenteneffekte sterischer Natur analog auf $\delta^{11}\text{B}$ und $\delta^{13}\text{C}$ wirken, kann eine lineare Beziehung $\delta^{11}\text{B}/\delta^{13}\text{C}$ nur dann erwartet werden, wenn Änderungen des Anteils der π -Rückbindung zwischen Bor, bzw. Kohlenstoff, und geeigneten Substituenten ein konstantes Verhältnis annehmen. Nach Abb. 1 wird diese Forderung jedoch nur von einem Teil der Verbindungspare erfüllt.

Der Trend der $\delta^{11}\text{B}$ - und $\delta^{13}\text{C}$ -Werte in Tab. I ist mit (pp)- π -Bindungsanteilen abhängig von der Natur der Substituenten X zu erklären. $\delta^{11}\text{B}$ -Werte in $\text{R}_{3-n}\text{BX}_n$ ($n = 1, 2, 3$; $\text{R} = \text{Alkyl}, \text{H}$; $\text{X} = \text{F}, \text{OR}, \text{NR}_2$) können konsistent interpretiert werden, wenn man die Änderung von BX - π -Bindungsanteilen aufgrund der Gegenwart anderer Substituenten bedenkt [3]. Verstärkte Polarisierung der σ -Bindungen in trigonalen Boranen durch elektronegative Substituenten X erhöht die π -Akzeptorfähigkeit des Bors, und damit auch den Anteil der BX - π -Bindung. Obwohl der gleiche Mechanismus für die Abschirmung der $\text{C}^\oplus$ -Kerne in Carbeniumionen gilt, wird er im Gegensatz zu den Boranen für CX - π -Bindungen von geringerer Bedeutung sein, da das carbokationische Zentrum bereits eine formal positive Ladung aufweist. Die Analyse der durchgezogenen Linie in Abb. 1 zeigt darum auch, daß die lineare

Beziehung $\delta^{11}\text{B}/\delta^{13}\text{C}$ dann erfüllt ist, wenn stark elektronegative Substituenten am Bor oder Kohlenstoff gebunden sind (OR, F, Cl), oder im Fall von Substituenten die nicht signifikant zur π -Elektronendichte $q_{\text{B}\pi}$ oder $q_{\text{C}\pi}$ beitragen (H, Alkyl, Br). Für die übrigen Verbindungspare sind die Daten in Abb. 1 weit verstreut. Allgemein folgt daraus, daß weniger elektronegative Substituenten, obwohl fähig zur π -Rückbindung, eine bessere Abschirmung von $\text{C}^\oplus$ im Vergleich zum Bor bewirken.

Amino- und Thioborane $\text{R}_{3-n}\text{BX}_n$ ($n = 1, 2$; $\text{R} = \text{H}, \text{Alkyl}$; $\text{X} = \text{NR}_2, \text{SR}$)

Bereits der Vergleich von $\delta^{11}\text{B}$ - und $\delta^{13}\text{C}$ -Werten der Aminoderivate 49–64 belegt die relative Verminderung der BN - π -Rückbindung im Vergleich zur $\text{C}^\oplus\text{N}$ -Bindung infolge unzureichender Polarisierung des σ -Bindungsgerüsts in Aminoboranen. Dieser Trend verstärkt sich erwartungsgemäß für BS - π -Bindungen, wie die Abweichung der $\delta^{13}\text{C}$ -Werte von Ditholiumkationen und der $\delta^{11}\text{B}$ -Werte entsprechender Borane (47, 48) von Gl. (1) zeigt. Dies steht in Übereinstimmung mit schwachen BS - π -Bindungen, wie nach Photoelektronen Spektren gefordert [12].

Phenyl-, Alkenyl-, Alkynyl- und Cyclopropylborane

Von besonderem Interesse sind die Bindungsverhältnisse in Phenyl-, Alkenyl-, Alkynyl- und Cyclopropylboranen, für die verschiedentlich BC - π -Bindungsanteile postuliert wurden [13–17]. Ein Vergleich der $\delta^{11}\text{B}$ -Werte dieser Verbindungen mit

$\delta^{13}\text{C}^\oplus$ -Werten entsprechender Carbeniumionen (11 bis 23) belegt deutlich die verstärkte π -Ladungsdelokalisierung in den Carbokationen im Vergleich zu den Boranen nach Gl. (1). Dies wird z. B. überzeugend demonstriert, wenn man $\delta^{11}\text{B}$ - und $\delta^{13}\text{C}^\oplus$ -Werte der Alkinylborane 13a, 14a mit den Alkylcarbeniumionen 13b und 14b vergleicht. Bei letzteren bewirkt der Ersatz der Methylgruppe an der $\text{C}\equiv\text{C}$ -Dreifachbindung durch eine Phenylgruppe eine Verschiebung der $^{13}\text{C}^\oplus$ -Resonanz um 32 ppm zu höherem Feld, während die ^{11}B -Resonanz in den analogen Boranen sich nicht ändert.

Sterische Effekte auf die Abschirmung des Bors und des $\text{C}^\oplus$ -Kerns in 1-Phenyl-1-boracyclopentan und dem 1-Phenylcyclopentylcarbeniumion (18) im Vergleich zu den entsprechenden 6-Ringderivaten (17) sind analog: $\delta^{11}\text{B}$ - und $\delta^{13}\text{C}^\oplus$ -Werte für die 5-Ringe sind größer als für die 6-Ringe. Bemerkenswert ist jedoch, daß der Ringschluß zum Boraindian (19a) die Abschirmung des Bors nur wenig erhöht, während die $^{13}\text{C}^\oplus$ -Resonanz im Indanyl kation (19b) merklich zu niedrigeren Frequenzen verschoben ist. Dies belegt, daß die Eingliederung des dreibindigen Bors und des carbokationischen Zentrums in einen geeigneten Ring die BC- und $\text{C}^\oplus\text{C}(\text{pp})$ - π -Wechselwirkungen erhöht, daß dieser Effekt jedoch für $\text{C}^\oplus$ wesentlich stärker ausgeprägt ist.

Die signifikante π -Ladungsdelokalisierung in Phenyl-, Alkenyl- und Alkylcarbeniumionen im Vergleich zu den entsprechenden Boranen folgt auch aus den $\delta^{13}\text{C}$ -Werten der para-Kohlenstoffe [2, 13], bzw. der β -Kohlenstoffe [14–16, 18] im Einklang mit der Beteiligung der Grenzstrukturen A–C am Grundzustand.

Sterische Effekte

Der Gang der $\delta^{11}\text{B}$ - und $\delta^{13}\text{C}^\oplus$ -Werte in Trialkylboranen und -carbeniumionen 1–7, 9, 10 ist sehr ähnlich, insbesondere was die Konstanz der Werte für 1–4 angeht. In den cyclischen Verbindungen 5 und 7, sowie 17 und 18 wird zwar der gleiche Trend aufgefunden, die Differenzen $\delta^{11}\text{B}$ und $\delta^{13}\text{C}$ sind jedoch unterschiedlich. Für die Verbindungen 6 wird eine schlechtere Abschirmung des Bors und eine bessere Abschirmung des $\text{C}^\oplus$ -Kohlenstoffs beobachtet. Dies mag zum Teil mit verschiedenen

Ringkonformationen [19] zu erklären sein, möglich ist jedoch auch eine verstärkte $\text{CC}-\sigma$ -Elektronen-delokalisierung in den cyclischen Carbeniumionen, wie sie für das 2-Methyl-2-norbornyl-Kation postuliert wurde [20]. Bemerkenswert ist, daß sich $\delta^{11}\text{B}$ - und $\delta^{13}\text{C}^\oplus$ -Werte für die Adamantanderivate 9, 10 analog ändern.

Die Streuung der Werte in Abb. 1 demonstriert, daß eine lineare Beziehung $\delta^{11}\text{B}$ und $\delta^{13}\text{C}^\oplus$ nicht generell gilt. Innerhalb verschiedener Verbindungsklassen bestehen jedoch Trends, die darauf schließen lassen, daß ähnliche Strukturen vorliegen und daß die Größe von $\delta^{11}\text{B}$ und $\delta^{13}\text{C}^\oplus$ überwiegend von $\text{pp}(\pi)$ -Wechselwirkungen bestimmt wird.

Metalloen-Derivate

In Anbetracht der Ergebnisse neuer ^{57}Fe -NMR-Untersuchungen von Organo-eisen-Komplexen, die für Ferrocenylcarbokationen ($\text{FcC}^\oplus$) eine fulvenartige Struktur des substituierten Cyclopentadienrestes unterstützen [21] ist der Vergleich von $\delta^{11}\text{B}$ für Ferrocenylborane und $\delta^{13}\text{C}^\oplus$ von $\text{FcC}^\oplus$ [22] sowie $\text{Fc}(\text{C}^\oplus)_2$ [23] besonders interessant. $\delta^{11}\text{B}$ -Werte von Ferrocenylboranen [24] lassen ähnliche BC-(pp)- π -Wechselwirkungen wie in Phenylboranen erwarten. Wie aus Abb. 1 ersichtlich, weicht das Wertepaar $\delta^{11}\text{B}/\delta^{13}\text{C}^\oplus$ für 24 weit von dem Bereich ab, der für Phenylderivate gefunden wurde. Hingegen finden sich $\delta^{11}\text{B}/\delta^{13}\text{C}^\oplus$ -Werte für 25 in diesem Bereich. Dies bestätigt einerseits Ergebnisse der ^{57}Fe -NMR-Messungen [21] und legt zudem nahe, daß die Borylgruppe als Substituent die Bindungsverhältnisse im Ferrocensystem viel weniger beeinflusst als ein CR_2 -Rest. Die Strukturen des Dikations 25b und des Diborylferrocens 25a sollten aufgrund der $\delta^{11}\text{B}/\delta^{13}\text{C}^\oplus$ -Werte ähnlich sein und nur wenig von der Ferrocenstruktur abweichen.

In diesem Zusammenhang scheint es wichtig darauf hinzuweisen, daß sich auch die $\delta^{13}\text{C}^\oplus$ -Daten von Aryltricarbonylchromkationen [25] und $\delta^{11}\text{B}$ -Daten von borylsubstituierten Aryltricarbonylchromkomplexen [26] nicht in den allgemeinen Gang einfügen. Die ^{11}B -Resonanzen liegen bei vergleichsweise hohen Frequenzen, während die $^{13}\text{C}^\oplus$ -Kerne überraschend gut abgeschirmt sind. In der Tat sprechen die übrigen $\delta^{13}\text{C}$ -Werte für die Kationen [25] nicht gegen eine Struktur vom Pentadienyl-Typ, sondern sind gut vergleichbar mit $\delta^{13}\text{C}$ -Daten für Pentadienyltricarbonyl-eisen-Kation

Abb. 2. Korrelation von $\delta^{13}\text{C}(\text{BCH}_3)$ und $\delta^{13}\text{C}(\text{C}^+-\text{CH}_3)$ von trigonalen Boranen und Carbeniumionen. Die Numerierung entspricht den Einträgen in Tab. I.

[27] und für protoniertes Cyclooctatetraentricarbylisen [28].

Vergleich von $\delta^{13}\text{C}$ für Organoborane mit $\delta^{13}\text{C}$ für Carbokationen

Abb. 2 zeigt die lineare Beziehung zwischen ^{13}C -Resonanzen von $\text{B}-\text{CH}_3$ - und C^+-CH_3 -Kohlenstoff. Bedenkt man die weniger exakte Bestimmung von $\delta^{13}\text{C}(\text{BCH}_3)$ (± 1 ppm), ist die Übereinstimmung zufriedenstellend. Die Ausweitung dieser Korrelation unter Einbeziehung von $\delta^{13}\text{C}$ -Daten cyclischer Organoborane und cyclischer Carbokationen kann sich als hilfreich in der Konformationsanalyse beider Verbindungsklassen erweisen. Dies ist besonders

attraktiv hinsichtlich der unerwarteten Resultate, die kürzlich für 1-Alkyl-cyclohexylcarbokationen erhalten wurden [19].

Experimentelles

^{11}B - und ^{13}C -NMR-Spektren wurden mit einem BRUKER WP 200-Gerät registriert. Soweit Verbindungen neu untersucht wurden (5a–7a, 14a, 31a, 37a, 38a, 41a, 45a, 47b) erfolgte die Darstellung nach bekannten Verfahren, und als Reinheitskontrolle dienten ^1H -, ^{11}B - und ^{13}C -NMR-Spektren.

Herrn Prof. Dr. H. Nöth danke ich für zahlreiche Diskussionen. Der Deutschen Forschungsgemeinschaft bin ich für Unterstützung dieser Arbeit zu Dank verpflichtet.

- [1] a) E. L. Muetterties, *Boron Hydride Chemistry*, Academic Press, New York 1975;
b) T. Onak, *Organoborane Chemistry*, Academic Press, New York 1975.
- [2] a) G. A. Olah, *Angew. Chem. Int. Ed. Engl.* **12**, 173 (1973);
b) G. A. Olah, *Topics in Current Chemistry* **80**, 19 (1979).
- [3] H. Nöth und B. Wrackmeyer, in P. Diehl, E. Fluck und R. Kosfeld (Herausg.): *NMR Spectroscopy of Boron Compounds*, in *NMR Basic Principles and Progress*, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 1978.
- [4] a) Vergleiche Fußnoten in Tab. I betreffend $\delta^{13}\text{C}$ -Werte;
b) R. N. Young, *Progr. NMR Spectrosc.* **12**, 261 (1979).
- [5] H. Nöth und H. Vahrenkamp, *Chem. Ber.* **99**, 1049 (1966).
- [6] a) B. F. Spielvogel und J. M. Purser, *J. Am. Chem. Soc.* **89**, 5294 (1967);
b) J. M. Purser und B. F. Spielvogel, *Inorg. Chem.* **7**, 2156 (1968);
c) B. F. Spielvogel und J. M. Purser, *J. Am. Chem. Soc.* **93**, 4418 (1971).
- [7] L. J. Todd, A. R. Siedle, G. M. Bodner, S. B. Kahl und J. P. Hickey, *J. Magn. Reson.* **23**, 301 (1976).
- [8] H. O. Berger, H. Nöth und B. Wrackmeyer, *Chem. Ber.* **112**, 2884 (1979).
- [9] R. E. Williams, *IME BORON IV*, Salt Lake City/Snowbird, Abstracts, 1979.
- [10] H. Nöth und B. Wrackmeyer, *Chem. Ber.* **107**, 3089 (1974).
- [11] B. F. Spielvogel, W. R. Nutt und R. A. Izydore, *J. Am. Chem. Soc.* **97**, 1609 (1975).
- [12] J. Kroner, D. Nölle und H. Nöth, *Z. Naturforsch.* **28b**, 416 (1973).
- [13] J. D. Odom, T. F. Moore, R. Goetze, H. Nöth und

- B. Wrackmeyer, *J. Organomet. Chem.* **173**, 15 (1979).
- [14] L. W. Hall, J. D. Odom und P. D. Ellis, *J. Am. Chem. Soc.* **97**, 4527 (1975).
- [15] Y. Yamamoto und I. Moritani, *J. Org. Chem.* **40**, 3434 (1975).
- [16] H. O. Berger, H. Nöth und B. Wrackmeyer, *Chem. Ber.* **112**, 2866 (1979).
- [17] B. Wrackmeyer und H. Nöth, *Chem. Ber.* **110**, 1086 (1977).
- [18] G. A. Olah und H. Mayr, *J. Am. Chem. Soc.* **98**, 7333 (1976).
- [19] R. P. Kirchen und T. S. Sorensen, *J. Am. Chem. Soc.* **100**, 1487 (1978).
- [20] G. A. Olah, G. Liang und S. P. Jindal, *J. Am. Chem. Soc.* **98**, 2508 (1976).
- [21] A. A. Koridze, N. M. Astakhova, P. V. Petrovskii und A. I. Lutsenko, *Dokl. Akad. Nauk SSSR* **242**, 117 (1978).
- [22] a) S. Braun, T. S. Abram und W. E. Watts, *J. Organomet. Chem.* **97**, 429 (1975);
b) G. A. Olah und G. Liang, *J. Org. Chem.* **40**, 1848 (1975).
- [23] C. R. Jablonski, *J. Organomet. Chem.* **174**, C 3 (1979).
- [24] a) T. Renk, W. Ruf und W. Siebert, *J. Organomet. Chem.* **120**, 1 (1976);
b) W. Ruf, T. Renk und W. Siebert, *Z. Naturforsch.* **31b**, 1028 (1976).
- [25] M. Acampora, A. Ceccon, M. DalFarra, G. Giacometti und G. Rigatti, *J. Chem. Soc. Perkin II* **1977**, 483.
- [26] R. Goetze und H. Nöth, *J. Organomet. Chem.* **145**, 151 (1978).
- [27] a) G. A. Olah, S. H. Yu und G. Liang, *J. Org. Chem.* **41**, 2227, 2383 (1976);
b) G. A. Olah und G. Liang, *ibid.* **41**, 2659 (1976).
- [28] G. A. Olah, G. Liang und S. Yu, *J. Org. Chem.* **42**, 4262 (1977).
- [29] B. Wrackmeyer, *Progr. NMR Spectrosc.* **12**, 227 (1979).