Über Salze des fünfwertigen Mangans

Von HERMANN LUX

Aus dem Anorganisch-chemischen Laboratorium der Technischen Hochschule München

(Z. Naturforschg. 1, 281—283 [1946]; eingegangen am 11. Februar 1946)

Beim Eintragen von MnO_2 und Na_2O in eine NaNO_2 -Schmelze entsteht eine intensive Blaufärbung, die von einer Verbindung des 5-wertigen Mangans herrührt. Aus konz. Natronlauge kristallisiert das Hydrat $\text{Na}_3\text{MnO}_4 \cdot 10 \text{H}_2\text{O}$ in Form hellblauer Prismen, die sich in konz. Natronlauge schwer, in konz. Kalilauge leicht lösen. Die Bildung von Mischkristallen mit Natriumphosphat, -arsenat und -vanadat wird beobachtet.

Beim Verdünnen oder Erwärmen der Lösung erfolgt Disproportionierung in Manganat(VI) und MnO_2 ; in stärker alkalischer Lösung besteht das Gleichgewicht: $\text{Na}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + 4 \text{NaOH} \rightleftharpoons 2 \text{Na}_3\text{MnO}_4 + 2 \text{H}_2\text{O}$.

Die Darstellung von Manganat(V)-hydrat gelingt in einfacher Weise durch Reduktion von Manganat(VII) oder Manganat(VI) mit Na_2SO_3 in stark alkalischer Lösung; auch zahlreiche andere Reduktionsmittel führen zur 5-wertigen Stufe des Mangans, sofern man nur in stark alkalischer Lösung und in der Kälte arbeitet.

Wenn man geschmolzenes NaNO_2 bei etwa 500° mit MnO_2 und etwas Na_2O oder Na_2O_2 versetzt, zeigt sich in kurzer Zeit eine kräftige, *rein blaue* Färbung der Schmelze, die so lange bestehen bleibt, als noch überwiegend unzersetztes NaNO_2 vorhanden ist. In dem Maße, in dem sich der Übergang in NaNO_3 vollzieht, wird die Farbe grünstichiger und entspricht schließlich der bekannten tiefgrünen Manganatfärbung, wie sie bei Verwendung von NaNO_3 oder KNO_3 sogleich entsteht.

Diese Beobachtung machte ich schon bei den allerersten Vorversuchen, als ich mir die Frage vorlegte, welche Beziehungen zwischen der Alkalität und der Manganatfärbung einer Schmelze bei Gegenwart von MnO_2 als Bodenkörper bestehen. Über die Ergebnisse dieser Untersuchungen wird zusammen mit R. Frey an anderer Stelle berichtet werden.

Da die Blaufärbung der NaNO_2 -Schmelzen ungefähr die gleiche Intensität aufwies wie die Grünfärbung der NaNO_3 -Schmelzen, schien der Farbunterschied mit der Anwesenheit von NO zusammenzuhängen. Als sich jedoch verschiedentlich nach dem Abkühlen blauer Schmelzen eine intensiv blaue Kruste an der Wand des Tiegels vorfand, entschloß ich mich zu systematischen Versuchen, die bald zeigten, daß man Schmelzkuchen erhalten konnte, die namentlich in einer mittleren Schicht reichlich dunkelblaue Körner neben farblosem NaNO_2 , NaNO_3 und Na_2O enthielten. Man schmolz hierzu NaNO_2 bei 500—550° im Silbertiegel ein, trug pulverisiertes KMnO_4 , dann Na_2O_2 unter Umrühren ein und ließ nach etwa 10 Min. im Ofen abkühlen.

Die Untersuchung der blauen Substanz ergab nun folgendes¹:

Beim Zusammenbringen mit Wasser entstand sofort tiefgrünes Manganat, gleichzeitig schied sich reichlich MnO_2 ab. Verdünnte Natronlauge oder konzentrierte Ammoniaklösung wirkten ebenso. Über Calciumchlorid blieb jedoch die feste Substanz tagelang unverändert, selbst wenn sie schon etwas Wasser angezogen hatte. In Übereinstimmung damit trat mit *konzentrierter* Natronlauge (1+1) keine Veränderung ein; die blaue Substanz blieb zum größten Teil ungelöst, die schwach blau gefärbte Lauge hielt sich bei Ausschluß von CO_2 und H_2O beliebig lange. Sehr viel größer war die Löslichkeit in konz. Kalilauge (1+1); beim Verdünnen der kräftig blauen, wie *konz. CuSO_4 -Lösung* aussehenden Lösung in Kalilauge entstand MnO_2 und grünes Manganat. Auch beim Erwärmen vollzog sich die gleiche Reaktion; hier entstand zunächst eine leuchtend grüne, klare Lösung, die sich rasch durch Ausscheidung von MnO_2 trübte.

Um festzustellen, in welchem Verhältnis MnO_4^{2-} und MnO_2 entstanden, wurde die blaue Substanz in der Kälte zunächst mit Natronlauge (1+1) verrieben, durch Filtration von dem in Lösung gegangenen grünen Manganat getrennt und auf dem Filter mit Kalilauge (1+1) gelöst, wobei etwas MnO_2 zurückblieb. Dann verdünnte man auf das Vierfache und filtrierte das ausgeschiedene MnO_2 nach 10—30 Min. ab. Die colorimetrische Bestimmung

¹ Sämtliche Angaben beziehen sich auf eine Arbeitstemperatur von 2—5°.

des Mangans lieferte Werte, die dem Molverhältnis 1:1 sehr nahe kamen, z. B. $\text{MnO}_4^{-2}:\text{MnO}_2 = 0,94:1$ und $0,96:1$. Genauere Übereinstimmung konnte nicht erwartet werden, da die Lösung auch NaNO_2 enthielt, das bei der angewandten Verdünnung der Lauge schon langsam mit MnO_4^{-2} reagierte. Ein weiterer Grund, warum sich nicht genau das Verhältnis 1:1 ergeben konnte, wird später zu nennen sein.

Die beschriebenen Versuche zeigten klar, daß es sich bei der blauen Substanz nicht etwa um eine NO-haltige Verbindung handelte, sondern *daß vielmehr eine Verbindung des fünfwertigen Mangans vorliegen mußte, die beim Verdünnen der stark alkalischen Lösung unter Disproportionierung in Manganat(VI) und MnO_2 zerfiel.*

Ließ man die blaue Substanz mit Natronlauge (1+1) über Nacht im Exsiccator stehen, so trat meist Kristallisation ein. Bei Anwendung von Natronlauge (1+2,5) entstanden *meist schon nach wenigen Sekunden gut ausgebildete hellblaue rechteckige Stäbchen*, die ersichtlich weniger löslich waren als das wasserfreie Ausgangsprodukt. Wie noch gezeigt werden wird, handelt es sich dabei um ein wasserreiches Hydrat. Ließ man das auskristallisierte Hydrat mit der Lauge im Exsiccator über Ätznatron stehen, so bildeten sich offenbar wasserärmere, tiefer blaue Kristalle von eigentümlicher, kometenähnlicher Form. Kristallisierte Kaliumsalze wurden bisher nicht beobachtet.

Wenn es sich wirklich um fünfwertiges Mangan handelte, war zu vermuten, daß das krist. Hydrat in seiner Zusammensetzung den entsprechenden Hydraten des fünfwertigen Phosphors, Arsens oder Vanadiums ähnlich und vielleicht mit diesen isomorph war. Kristallisationsversuche sprechen dafür, daß diese Annahme zutrifft. Natriumphosphat, -arsenat und -vanadat kristallisieren aus Natronlauge gleicher Konzentration ebenfalls in Form rechteckiger Stäbchen. Läßt man Manganat(V) und Arsenat, Phosphat oder Vanadat nebeneinander kristallisieren, so beobachtet man unter dem Mikroskop eine Zone, in welcher der Grad der Anfärbung mit blauem Manganat(V) in stetiger Weise zunimmt.

Da Manganat(V) etwas weniger intensiv farbig ist als das tiefgrüne Manganat(VI), ist es neben diesem nur schwer zu erkennen. Dies dürfte auch der Grund sein, warum es sich bis heute der Beobachtung entzogen hat. Die eingehende Durchsicht der Literatur zeigte jedoch, daß V. Auger² schon 1910 ein kristallines Produkt von bläulich grünem Aussehen beschrieben hat, das er

durch Erhitzen von Manganat(VII) mit Ätznatron erhielt. Die Analyse des unreinen Salzes deutete auf die Formel $3\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{MnO}_2 \cdot \text{MnO}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$. Er betrachtete es wegen seines leichten Zerfalls als Doppelsalz mit 4- und 6-wertigem Mangan und bezeichnete es daher als Manganimanganat. Diese Auffassung wurde gestützt durch eine Arbeit von O. Sackur³, nach welcher in geschmolzenen Alkalicarbonaten oder -hydroxyden weitgehend unabhängig von der Temperatur und den Mengenverhältnissen Verbindungen der Zusammensetzung $8\text{K}_2\text{O} \cdot 2\text{MnO}_2 \cdot 3\text{MnO}_3$ und $4\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{MnO}_2 \cdot \text{MnO}_3$ entstehen. G. Just und Y. Kauko⁴ schlossen aus ihren Versuchen über die Reduktion von KMnO_4 mit H_2 oder CO , daß 5-wertiges Mangan als instabile Zwischenstufe auftreten müsse. Zum gleichen Schluß kam J. Holluta⁵. Er nahm zur Erklärung der Kinetik der Reaktion zwischen Permanganat und Formiat ein Anion mit 5-wertigem Mangan als Zwischenstufe an und konnte später sogar feststellen, daß das Maximum der bei dieser Reaktion in stark alkalischer Lösung vorübergehend beobachteten Blaufärbung mit dem Erreichen des 5-wertigen Zustandes beim Mangan zusammenfiel. Gegen die Auffassung, daß die Blaufärbung von einem Manganimanganat-Komplex herrühre, führt Holluta an, daß es ihm nicht gelungen sei, aus hydratischem Braunstein und Manganat(VI) blaugefärbte Lösungen zu erhalten.

Die geringe Löslichkeit und das gute Kristallisationsvermögen des beschriebenen Manganat(V)-hydrats ermöglichen es, Manganat(V) neben dem äußerst leicht löslichen Manganat(VI) zu erkennen. Es gelang so zu beweisen, daß die fünfwertige Stufe des Mangans keineswegs den Charakter einer instabilen Zwischenstufe hat, sondern im Gleichgewicht mit Manganat(VI) und MnO_2 in stark alkalischem Medium *völlig stabil ist. Bringt man nämlich reaktionsfähiges MnO_2 mit Manganat(VI) bei genügender NaOH-Konzentration zusammen, so bilden sich in kurzer Zeit die charakteristischen blauen Stäbchen des schwer löslichen Manganat(V)-hydrats.* Man löst dazu MnSO_4 in ganz wenig Wasser, fällt mit Natronlauge (1+2,5) und oxydiert mit Manganat(VI)-Lösung gleicher Laugekonzentration, bis eine schwache Grünfärbung bestehen bleibt. Bringt man dieses frisch hergestellte MnO_2 auf dem Objektträger mit überschüssiger Manganat(VI)-Lauge zusammen, so treten meist schon nach wenigen Minuten die Manganat(V)-Stäbchen auf. Man kann dabei deutlich beobachten, wie der Braunstein besonders stark in der Umgebung der wachsenden Kristalle aufgezehrt wird. Mit käuflichem MnO_2 gelingt die Reaktion nicht.

² C. r. hebd. Séances Acad. Sci. **150**, 470 [1910].

³ Ber. dtsch. chem. Ges. **44**, 777 [1911].

⁴ Z. physik. Chem. **76**, 638 [1911]; **82**, 71 [1913].

⁵ Z. physik. Chem. **106**, 324 [1923].

Zwischen Manganat(VI) und MnO_2 einerseits und Manganat(V) andererseits besteht somit ein Gleichgewicht

das dem Massenwirkungsgesetz entsprechend bei hoher NaOH-Konzentration so weit nach rechts verschoben ist, daß die Löslichkeit des Manganat(V)-hydrats überschritten wird. Die genauere Festlegung der Gleichgewichte und der zugehörigen Redoxpotentiale in Abhängigkeit von NaOH-Konzentration und Temperatur bleibt einer späteren Mitteilung vorbehalten.

Die Darstellung von Manganat(V)-hydrat gelingt sehr einfach: Mit einer Lösung von 2 g feinst pulverisiertem $KMnO_4$ in 50 ccm Natronlauge (1 + 2,5) werden 3,5 g fein zerriebenes $Na_2SO_3 + 7H_2O$ bei 0° etwa 10 Min. verrührt, bis das Ganze einheitlich hellblau geworden ist. Dann saugt man scharf ab und wäscht mit Natronlauge (1 + 2,5) nach.

Lösungen von Manganat(VII) oder Manganat(VI) in Natronlauge (1 + 2,5) werden in der Kälte durch Na_2SO_3 , $NaOOCH$ oder $Na_2S_2O_3$ quantitativ bis zur 5-wertigen Stufe reduziert. Bei mehreren anderen Reduktionsmitteln tritt blaues Manganat(V) nur vorübergehend als Zwischenstufe auf. Besonders hübsch sieht die Reaktion von $KMnO_4$ mit $NaBO_2 \cdot H_2O_2$ aus; hier zeigen sich innerhalb von 1–2 Min. alle vier Wertigkeitsstufen des Man-

gans (rotviolett — tiefgrün — himmelblau — braungelb). Eingehende Versuche haben gezeigt, daß die fünfwertige Stufe des Mangans etwa ebenso häufig auftritt wie andere Wertigkeitsstufen, sofern man nur in stark alkalischer Lösung und in der Kälte arbeitet.

In dem dargestellten Manganat(V)-hydrat waren SO_4^{2-} und K^+ nicht enthalten. Die jodometrische Bestimmung des Oxydationswertes ergab 3,01 val/g-atom Mn entspr. der Wertigkeitsstufe 5,01. Zur Analyse wurde Mangan durch Ammoniak und Brom abgetrennt; Mangan wurde als $MnSO_4$, Natrium als Na_2SO_4 gewogen. Bei zwei verschiedenen Präparaten ergaben sich folgende Werte:

	Na_2O	Mn_2O_5	H_2O (Differenz)
I.	23,50	16,14	60,36 Gew.-%
II.	23,78	16,41	59,81 Gew.-%

Beiden Präparaten haftete Natronlauge an, deren Gehalt zu 20,88 Gew.-% Na_2O bestimmt wurde. Die gefundenen Analysenwerte müssen, in ein Koordinatensystem eingetragen, auf einer Geraden liegen, welche die Punkte der Zusammensetzungen von Natronlauge und gesuchtem Hydrat miteinander verbindet. Beide Analysenwerte liegen nun recht genau auf der Verbindungslinie zum Punkt $Na_3MnO_4 + 10H_2O$; theoretische Werte sind z. B. 23,7% Na_2O , 16,2% Mn_2O_5 , 60,1% H_2O . Für das 12-Hydrat, dessen Vorliegen zunächst vermutet worden war, sollte bei gleichem Mangan Gehalt gefunden werden: 22,4% Na_2O , 16,2% Mn_2O_5 , 61,4% H_2O . Wie man erwarten darf, scheint somit das 5-wertige Mangan dem 5-wertigen Vanadium besonders ähnlich zu sein, das ebenfalls Hydrate mit 10 H_2O bildet. Über die Mischkristallbildung zwischen Natriummanganat(V) einerseits und tertiärem Natriumarsenat, -phosphat und -vanadat andererseits sowie über die Hydratstufen sind noch eingehendere Untersuchungen erforderlich.

Zur Biochemie der Schilddrüsenfunktion, III. Mitteilung¹: Die entgiftende Wirkung des Vitamins C gegenüber kropferzeugenden Substanzen

Von FRIEDRICH HÜTER

Aus dem Institut für Chemotherapie „Georg-Speyer-Haus“, Frankfurt a. M.

(Z. Naturforsch. 1, 283–287 [1946]; eingegangen am 8. April 1946)

Der Schilddrüsenreizstoff des Weißkohles erzeugt im lebenden Organismus einen relativen C-Vitaminmangel. Die Ascorbinsäure wirkt hinsichtlich strumigener Substanzen kropfhemmend. Das rasche Entstehen einer mehrfach vergrößerten, basedowähnlichen Schilddrüse durch eine pflanzliche Noxe plus Allylthioharnstoff wird beschrieben.

Marine und Mitarbeiter² berichten über einen kropfhemmenden Pflanzenwirkstoff und nehmen an, das Vitamin C übe vielleicht diese antagonistische Wirkung aus; sie bringen aber dafür

¹ I. Mitteilg.: Th. Wagner-Jauregg u. E. Schreiber, Biochem. Z. 317, 21 [1944]; II. Mitteilg.: Th. Wagner-Jauregg u. J. Koch, unveröffentl.

keine experimentellen Beweise. Nach ihren Befunden führt gedämpfter und abgepreßter Kohl zu einer stärkeren Schilddrüsenwucherung als frischer. Wir prüften mit handelsüblichem Weißkraut

² Marine, Baumann, Webster u. Cipra, J. exp. Medicine 57, 121 [1933]; ferner J. biol. Chemistry 89, 213 [1930].