Abb. 1.

Abfall von 3,5 h auf, der schließlich in einen Abfall von 73 d überging. Nach Abzug dieser Komponente ergab sich für die Halbwertszeit der kurzlebigen Aktivität $T = 2,5 \pm 0,1$ h, in vorzüglicher Übereinstimmung mit dem obigen Befund, daß es sich hierbei um eine Dy-Verunreinigung handelt.

Sollte reines Terbium außer der 73-d-Aktivität noch eine solche von 3,3 h bis 3,9 h zeigen, welche also beim vorliegenden Präparat durch die Dy-Verunreinigung verdeckt sein würde, so könnte diese höchstens 5% der hier gemessenen 2,4-h-Aktivität betragen, d. h. der Wirkungsquerschnitt für Aktivierung durch langsame Neutronen müßte $< 0,5 \cdot 10^{-24}$ cm² sein. Es liegt aber nunmehr kein Grund mehr vor, beim Tb eine 3,3–3,9-h-Aktivität anzunehmen.

Über die Häufigkeiten der Isotope des Zirkons

Von Heinrich Hintenberger

Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie, Tailfingen

(Z. Naturforsch. 4a, 76 [1949]; eingeg. am 21. Dez. 1948)

Eines der wenigen Elemente, bei denen die Häufigkeiten der Isotope noch nicht auf elektrometrischem Wege bestimmt wurden, ist das Zirkon. Dieses Element wurde bisher nur von Aston¹ untersucht, der 5 Isotope entdeckte und auf photometrischem Wege die in Zeile 1 der Tabelle angeführten Häufigkeiten ermittelte. In Zeile 2 sind die Häufigkeiten angeführt, die auf elektrometrischem Wege mit einem Massenspektrometer vom Nierschen Typ erhalten wurden. Bei den Astonischen Messungen war offensichtlich das Isotop der Masse 92 noch von einer Störlinie überlagert. Die erhaltenen Häufigkeiten ergeben die mittlere Massenzahl 91,32. Daraus folgt mit einem Packungsanteil von $-6,75^2$ ein vorläufiger Wert für das chemische Atomgewicht von 91,237, der mit dem internationalen Tabellenwert 91,22 von 1942/43 zu ver-

gleichen ist. Genauere Angaben erfolgen bei anderer Gelegenheit.

Prozentuale Häufigkeiten der Isotope des Zirkons.

Massen:	90	91	92	94	96
Häufigkeit in %	48	11,5	22	17	1,5
Häufigkeit in %	51,7	10,8	17,1	17,5	2,9

Aston

vorliegende Arbeit

Anm. b. d. Korrektur: Inzwischen erschien eine Veröff. von J. R. White und A. E. Cameron (Physic. Rev. 74, 991 [1948]) aus den Clinton Engineer Works, Oak Ridge, in der u. a. auch die Häufigkeiten der Zirkonisotope elektrometrisch gemessen wurden. Die von diesen Autoren angegebenen Häufigkeiten sind 51,46; 11,23; 17,11; 17,40; 2,80.

¹ F. W. Aston, Nature [London] 114, 273 [1924]; Philos. Mag. J. Sci. 49, 1195 [1925]; Nature [London] 133, 684 [1934]; Proc. Roy. Soc. [London], Ser. A 149, 396 [1935].

² S. Flüge u. J. Mattauich, Isotopenbericht 1942. Physik. Z. 44, 181 [1943].

Die Lage des isoelektrischen Punktes bei γ -Al₂O₃ und verschiedenen Modifikationen des Al(OH)₃

Von R. Fricke und H. Keefer¹

Anorganisch-chemisches Laboratorium der Technischen Hochschule Stuttgart

(Z. Naturforsch. 4a, 76–77 [1949]; eingeg. am 7. Januar 1949)

Nachdem es gelungen war, größtenteils an Hand der hydrolytischen Adsorption von Alkaliphosphat nachzuweisen, daß in der allotropen Alterungsreihe Böhmit-Bayerit-Hydrargillit die alkalischen Eigenschaften

¹ 94. Mitt. von R. Fricke u. Mitarbb. über aktive feste Stoffe; 93. Mitt. O. Eberspächer, Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 53 [1949], im Druck.