zu erwarten ist. Es bleibt daher keine andere Deutungsmöglichkeit der Clarschen experimentellen Befunde als die, daß außer dem Einfluß der Differenz $P' - P$ auf das Gleichgewicht zwischen den beiden tautomeren Formen noch ein anderer Einfluß vorhanden ist, der jenem entgegenwirkt und den wir als die Energiedifferenz $W_0 - W'_0$ zwischen den in beiden Formen verschiedenartig gebundenen H-Atomen interpretierten. Einen solchen Einfluß hat Clar nie in Betracht gezogen, und diese Deutung wurde von uns daher irrtümlich Clar zugeschrieben.

Bemerkung zu voranstehendem Nachtrag von E. Hückel und B. Krause

Von Eric Clar

Chemistry Department, University, Glasgow, Scotland

(Z. Naturforschg. 6a, 515 [1951]; eingeg. am 14. Juli 1951)

Wir haben erstmalig das schon oft angenommene Gleichgewicht zwischen Methylacenen I und Methylendihydroacenen II experimentell bewiesen¹.

Das Ergebnis steht beim Methylpentacen, das nur in der Methylen-Form beständig ist, im Widerspruch zu einer quantenmechanischen Voraussage von Sirkin und Diatkina², wonach sich das Gleichgewicht in der Acenreihe mit unendlicher Ringzahl einem Prozentsatz von 50%:50% nähern soll. Wir haben daher die Betrachtungsweise nach Pauling³, wie sie im vorangehenden in dankenswerter Weise von E. Hückel und B. Krause nach einer irrtümlichen Wiedergabe in ihrer Arbeit⁴ richtig gestellt wird, vorgezogen. Hückel und Krause haben dagegen zur Erklärung des Ergebnisses eine Energiedifferenz in den Einfachbindungen $W_0 - W'_0 = 0,11 \gamma = 4,4$ kcal angenommen, die sich nicht voraussagen und berechnen ließ und die ebensogut ein umgekehrtes Vorzeichen haben könnte.

Es ist nicht die Angelegenheit des experimentierenden Chemikers, die relativen Vorzüge der Valence-Bond-Methode und der Molecular-Orbital-Methode zu diskutieren. Wir ziehen es daher vor, weitere Methylacene zu synthetisieren und die gefundenen Gleichgewichte mit den berechneten von Hückel und Krause zu vergleichen.

¹ E. Clar u. J. Wright, Nature [London] 163, 921 [1949]; E. Clar, Chem. Ber. 82, 508 [1949].

² I. K. Sirkin u. M. E. Diatkina, Bull. Acad. Sci. URSS. Sér. Chim. 1946, 153.

³ L. Pauling, The Nature of Chemical Bond 1948, S. 137.

⁴ E. Hückel u. B. Krause, Z. Naturforschg. 6a, 112 [1951].

Eine Erweiterung des Gesetzes von Blondel und Rey

Von Joachim Katz

Aus dem Lichttechnischen Institut der T. H. Karlsruhe

(Z. Naturforschg. 6b, 515—516 [1951]; eingeg. am 20. Juni 1951)

Nach K. F. Zimmermann folgt die Wahrnehmbarkeit eines helleren Details in dunklerem Umfeld bei konstanter Adaptationsleuchtdichte der Gesetzmäßigkeit, daß die kritische Reizgeschwindigkeit dem Kontrast proportional ist. Es wird gezeigt, daß dieser Zusammenhang eine Erweiterung des bekannten Gesetzes von Blondel und Rey darstellt.

Die Dissertation von K. F. Zimmermann¹ aus dem Jahr 1935 scheint in Kreisen der Vertreter der Physiologischen Optik sowie auch der Lichttechnik bisher zu wenig Beachtung gefunden zu haben.

Zimmermann ging aus von der Fragestellung nach der zweckmäßigen Bildwand-Beleuchtungsstärke bzw. -Leuchtdichte in Kinotheatern. Er ermittelte die zur Wahrnehmung eines foveal zu beobachtenden Testflecks erforderliche kritische Reizdauer als Funktion des variablen Kontrastes. Der Testfleck wurde dabei in positivem Kontrast zu seinem Umfeld gehalten, d. h. er erschien heller als seine Umgebung. Eines der Hauptresultate dieser Untersuchungen war die Entdeckung, daß das Produkt aus Kontrast und kritischer Reizdauer bei gegebenen Adaptationsverhältnissen und festliegender Grundleuchtdichte konstant ist. Das bedeutet mit anderen Worten, daß die kritische Reizgeschwindigkeit dem Kontrast direkt proportional ist. Der Kontrast ist dabei im üblichen Sinne definiert als das Verhältnis von Differenzleuchtdichte zu Umfeldleuchtdichte. Die Leuchtdichte werde mit B und die zur Wahrnehmung notwendige kritische Reizdauer mit t_w bezeichnet. Dann wird die von Zimmermann gefundene Gesetzmäßigkeit durch folgende Gleichung dargestellt:

$$\frac{\Delta B}{B} t_w = \text{const.} \quad (1)$$

Sie stimmt formal überein mit dem Gesetz von Blondel und Rey²:

$$\frac{E - E_0}{E} t_w = A_0, \quad \text{mit } A_0 = 0,21 \text{ sec.} \quad (2)$$

E ist die Beleuchtungsstärke in der Pupille des Beobachters, erzeugt durch eine in völlig dunkler Umgebung befindliche punktförmige Testlichtquelle. t_w ist, wie oben, die kritische Reizdauer. E_0 bezeichnet den Absolutschwellenwert. Ihm entspricht die kritische Reizdauer $t_w \rightarrow \infty$.

Bei Zimmermann war die kreisrunde Testfläche von 18 mm Durchmesser in 5,5 m Abstand vom Beobachter angeordnet. Sie erschien ihm daher unter dem Gesichts-

¹ K. F. Zimmermann, Lichttechnische Untersuchungen über Lichtbildprojektion, I. Dissert. T.-H. Karlsruhe 1935; II. Verlag Konrad Triltsch, Würzburg; III. Das Licht 6, 78—80, 98—99, 115—118 u. 138—140 [1936].

² A. Blondel et J. Rey, Sur la perception des lumières brèves à la limite de leur postée, J. Physique théorique et appliquée 1, 530—550 [1911].