

CONTRIBUTION A LA SYSTEMATIQUE
DES *CHEIROGALEINAE* (LEMURIENS MALGACHES).
ALLOCEBUS, GEN. NOV.,
POUR *CHEIROGALEUS TRICHOTIS* GUNTHER 1875

par

A. PETTER-ROUSSEaux et J. J. PETTER

L'étude d'un nouvel exemplaire d'un très rare Lémurien de Madagascar permet de réviser la position systématique de l'espèce et de la rapporter à un genre nouveau. Par son allure générale *Allocebus* diffère autant de *Cheirogaleus* que de *Microcebus* et de *Phaner*. Par sa denture il se rapproche de *Phaner* mais s'en distingue par la morphologie de sa région mastoïde.

Nous avons signalé en 1956 l'existence, dans les collections du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, de deux spécimens d'un Lémurien malgache, déterminés comme *Cheirogaleus trichotis* Günther 1875, l'un jeune, l'autre adulte, mais au crâne incomplet. A part ces deux exemplaires, on ne connaissait de cette espèce que le type, conservé au British Museum. Aucune précision n'était connue sur les lieux de capture de ces animaux.

En 1965, M. André Peyrieras nous a envoyé de la région de Mananara, dans l'Est de Madagascar, un *Cheirogaleus trichotis* qu'il avait pu garder quelques jours en captivité. Ce Lémurien, de mœurs nocturnes, avait été capturé dans un trou d'arbre.

D'après l'ensemble de ses caractères externes et certaines particularités anatomiques, il nous a paru nécessaire de modifier la position systématique de cet animal en le plaçant dans un genre distinct de *Cheirogaleus* : *Allocebus*, gen. nov.

RAPPEL DE LA SYSTÉMATIQUE DE LA SOUS-FAMILLE
DES *Cheirogaleinae*

On reconnaissait jusqu'à présent 3 genres dans cette sous-famille : *Cheirogaleus*, *Microcebus*, *Phaner* (Schwarz 1931 ; Hill 1953).

Le genre *Cheirogaleus*, établi en 1812 par E. Geoffroy, comprend