

## NOTES

---

### NOTES SUR LES MAMMIFÈRES DE FRANCE. VI. SUR LA NOURRITURE DE LA GENETTE, *Genetta genetta* (LINNAEUS, 1758), EN VENDÉE

Les données concernant la nourriture de la Genette dans les conditions naturelles ne sont guère précises. On admet généralement que ce *Viverridae* consomme des Rongeurs, des Oiseaux, des Insectes et autres Invertébrés (Vers et Mollusques) et des fruits. Le premier auteur de cette note a pu analyser le contenu stomacal de 6 exemplaires, tous capturés dans l'Ouest de la France, en Vendée. Nous pensons qu'il n'est pas sans intérêt de les publier ici.

TABLEAU I

Lieu de capture	Date	Sexe	Poids	L T + C	L queue	Contenu stomacal
Etang de Badiole	15.I.1965	M	1720	495	395 (440)	5 <i>Apodemus sylvaticus</i>
Forêt près Mouchamps	6.II.1965	M	1960	515	405 (450)	1 <i>Apodemus sylvaticus</i> , 1 Oiseau (Grive mauvis ?)
Forêt près Mouchamps	4.VI.1965	M	1360	470	390 (420)	Estomac presque vide, à l'exception de quelques poils de Rongeurs
Forêt près Mouchamps	24.IV.1965	M	1840	500	410 (450)	Restes d'un poulet dont la tête
Forêt près Mouchamps	30.I.1965	F	1660	510	395 (440)	1 <i>Apodemus sylvaticus</i> , 1 Grive
St-Hilaire-de-Talmont	31.XII.1948	M	1760	510	440 (480)	1 <i>Apodemus sylvaticus</i> , 1 Oiseau (Rouge-gorge ?), quelques brins d'herbe, 1 griffe et 1 doigt lui appartenant (1)

Les poids sont donnés en grammes, les longueurs en millimètres. Pour la longueur de la queue, le chiffre entre parenthèses correspond à la longueur des vertèbres augmentée de celle du pinceau terminal.

(1) Il s'agit d'un individu pris au piège, qui a sans doute tenté de s'échapper.