

# MAMMALIA

---

## LES MILIEUX FRÉQUENTÉS PAR LE COLOBE BAI D'AFRIQUE DE L'OUEST (*COLOBUS BADIUS TEMMINCKI* KUHL, 1820) EN SÉNÉGAMBIE

par

Bernard L. GATINOT

*Colobus badius temmincki* est présent en Sénégambie dans les secteurs phytogéographiques guinéen et soudanien. A l'intérieur de ce dernier, les Colobes bais ne dépassent pas la latitude 13°50'N vers le nord et la longitude 13°15'O vers l'est. Cette latitude coïncide sensiblement avec l'isohyète moyenne annuelle des 1 050 mm. Cette limite correspond également à celle de l'extension septentrionale des galeries et franges forestières guinéennes. On montre que la présence simultanée d'une végétation de type guinéen et des Colobes bais est la règle générale en secteur soudanien.

Booth (1958), dans sa revue des Primates d'Afrique de l'Ouest, a souligné le caractère particulier de *Colobus badius temmincki*, comparé aux autres Colobidés présents dans la même région. Il affirmait notamment : « It has apparently survived as a form adapted to existence in the Dry Deciduous Forest beyond the High Forest zone proper ».

Effectivement, l'aire de répartition du Colobe bai en Sénégambie (Gatinot, 1974) couvre une grande partie du secteur phytogéographique soudanien, caractérisé par la forêt claire et sèche ou la savane boisée telles que les définit Aubréville (1948). Cependant les nombreuses bandes de Colobes bais que nous avons rencontrées ne sont pas localisées en n'importe quelle localité à l'intérieur du secteur soudanien. *C. b. temmincki* reste un Colobidé typique, aux mœurs arboricoles et possédant un régime alimentaire de type folivore, qui se maintient en secteur soudanien dans la mesure où sont présents des milieux d'origine guinéenne tels que galeries et franges forestières.